

Kontakt- und Luftisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen **vor dem Betreten des Patientenzimmers**

- Der Vorgang wird vor dem Zimmer oder im Vorraum durchgeführt.
- Beim Anlegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge.



1. Hygienische Händedesinfektion

- ☐ Sterillium® pure
- ☐ Skinman™ Soft Protect



2. Einweg-Überschürze

(mit langen Ärmeln und Handgelenksbund)



- ### 3. ☐ FFP2-Atemschutzmaske (Fit-Check)
- ☐ FFP3-Atemschutzmaske (Fit-Check)



- ### 4. ☐ Schutzbrille (SUVA, mit Seitenschutz)



5. Einweg-Handschuhe

Information zur Lüftung:

- ☐ Unterdruck aktiviert ☐ alternativ: Luftreinigungsgerät (HEPA-Filter)
- Unterdruck bzw. HEPA-Filter nach Austritt für 60 Min. belassen

Information für den Reinigungsdienst:

- ☐ Tägliche Desinfektion ☐ Schlussdesinfektion ☐ 2x Schlussdesinfektion
- ☐ Incidin™ Pro 0.5% ☐ Dismozon® plus 2.4%

Kontakt- und Luftisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen beim Verlassen des Patientenzimmers

- Beim Ablegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge.



1. Handschuhe ausziehen



2. Hygienische Händedesinfektion



3. Einweg-Überschürze ausziehen
und in den Abfallsack entsorgen



4. Hygienische Händedesinfektion



5. Schutzbrille ausziehen



6. FFP2/FFP3-Atemschutzmaske ausziehen



7. Hygienische Händedesinfektion

FFP2- und FFP3-Atemschutzmasken können mehrmals von derselben Person benutzt werden. Tragedauer max. eine Schicht (8 Std.). Deponieren in bezeichneter Einweg-Nierenschale (Aussenseite nach unten, Schale abdecken) oder aufhängen. Bei Durchnässung wechseln.

Desinfektionsmittel für alle Gegenstände, die aus dem Zimmer genommen werden, und für alle Flächen:

☐ Ethanol 70% denat.

☐ Meliseptol® Wipes sensitive 100