

Kontakt- und Tröpfchenisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen vor dem Betreten des Patientenzimmers

- Der Vorgang wird vor dem Zimmer oder im Vorraum durchgeführt.
- Beim Anlegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge.



1. Hygienische Händedesinfektion

- ☐ Sterillium® pure
- ☐ Skinman™ Soft Protect



2. Einweg-Überschürze (mit langen Ärmeln und Handgelenksbund)



- ### 3. ☐ Mund-Nasen-Schutz (Typ II/IIR)
- ☐ FFP2-Atemschutzmaske (Fit-Check)



4. ☐ Schutzbrille (SUVA, mit Seitenschutz)



5. Einweg-Handschuhe

Information für den Reinigungsdienst:

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ Tägliche Desinfektion | ☐ Schlussdesinfektion | |
| ☐ Incidin™ Pro 0.5% | ☐ Dismozon® plus 2.4% | ☐ UVC-Desinfektion |

Kontakt- und Tröpfchenisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen beim Verlassen des Patientenzimmers

- Beim Ablegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge



1. Handschuhe ausziehen



2. Hygienische Händedesinfektion



3. Einweg-Überschürze ausziehen
und in den Abfallsack entsorgen



4. Hygienische Händedesinfektion



5. Schutzbrille ausziehen



6. Mund-Nasen-Schutz bzw.
FFP2-Atemschutzmaske ausziehen



7. Hygienische Händedesinfektion

FFP2- und FFP3-Atemschutzmasken können mehrmals von derselben Person benutzt werden. Tragedauer max. eine Schicht (8 Std.). Deponieren in bezeichneter Einweg-Nierenschale (Aussenseite nach unten, Schale abdecken) oder aufhängen. Bei Durchnässung wechseln.

Desinfektionsmittel für alle Gegenstände, die aus dem Zimmer genommen werden, und für alle Flächen:

- ☐ Ethanol 70% denat.
- ☐ Meliseptol® Wipes sensitive 100
- ☐ SANITIZER SURFACES S1 wipes