

Luftisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen vor dem Betreten des Patientenzimmers

- Der Vorgang wird vor dem Zimmer oder im Vorraum durchgeführt.
- Beim Anlegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge.



1. Hygienische Händedesinfektion

☐ Sterillium® pure



2. Einweg-Überschürze

(mit langen Ärmeln und Handgelenksbund)



3. ☐ FFP2-Atemschutzmaske (Fit-Check)

☐ FFP3-Atemschutzmaske (Fit-Check)



4. Einweg-Handschuhe

Information zur Lüftung:


- ☐ Unterdruck aktiviert ☐ alternativ: Luftreinigungsgerät (HEPA-Filter)
Unterdruck bzw. HEPA-Filter nach Austritt für 60 Min. belassen

Information für den Reinigungsdienst:

- ☐ Tägliche Unterhaltsreinigung ☐ Austritts-/Schlussreinigung
☐ Incidin™ Pro 0.5% ☐ Schlussdesinfektion

Luftisolation

Vorsichtsmassnahmen für Personal und Besuchende



Durchzuführen beim Verlassen des Patientenzimmers

- Beim Ablegen der Schutzkleidung gilt die angegebene Reihenfolge.



1. Handschuhe ausziehen



2. Hygienische Händedesinfektion



3. Einweg-Überschürze ausziehen und in den Abfallsack entsorgen



4. Hygienische Händedesinfektion

Vor dem Zimmer:



5. FFP2-/FFP3-Atemschutzmaske ausziehen



6. Hygienische Händedesinfektion

FFP2- und FFP3-Atemschutzmasken können mehrmals von derselben Person benutzt werden. Tragedauer max. eine Schicht (8 Std.). Deponieren in bezeichneter Einweg-Nierenschale (Aussenseite nach unten, Schale abdecken) oder aufhängen. Bei Durchnässung wechseln.

Desinfektionsmittel für alle Gegenstände, die aus dem Zimmer genommen werden, und für alle Flächen:

☐ Ethanol 70% denat.

☐ Meliseptol® Wipes sensitive 100