

Universitätsspital Basel
 Petersgraben 4, CH-4031 Basel
 Telefon +41 61 265 50 53, Fax +41 61 265 31 98

Hintergrund

- Intravenöse (IV) Antibiotikatherapien verlängern häufig die Hospitalisationsdauer bei Patienten ohne zusätzliche Hospitalisationsindikation
- Die ambulante Verabreichung von IV Antibiotika ist für viele Indikationen wirksam und sicher
- Die häufigsten Indikationen sind Haut- und Weichteilinfektionen, Osteomyelitis, septische Arthritis, und andere mehr (IDSA Guidelines, 2004)

OPAT am USB

- Ab Januar 2014 gibt es ein OPAT-Programm am USB
- Anmeldung während der Hospitalisation (3 Tage vor Austritt) durch den behandelnden Arzt
- Anmeldung mittels Formular (im ISMED beim Patienten unter Formulare/OPAT → Anmeldung)
 → Bitte Formular ausfüllen → abgespeicherte Formulare werden automatisch 11.00 und 15.00 elektronisch geschickt an **opat.infektiologie@usb.ch**
 → In dringenden Fällen bitte telefonische Anmeldung bei der OPAT-Nurse (65424)

Alternativ alle Formulare abrufbar unter:

<http://www.unispital-basel.ch/das-universitaetsspital/bereiche/medizin/kliniken-institute-abteilungen/infektiologie-spitalhygiene/> oder
<http://www.unispital-basel.ch/das-universitaetsspital/bereiche/medizin/kliniken-institute-abteilungen/medizinische-poliklinik/angebot/>



- Professionelle Abklärung durch OPAT Nurse (tel 65424) auf Abteilung
 - Venensituation (PICC-line, Port-à-cath, periphere Leitung, täglich neu legen)
 - Ort der Verabreichung (Medizinische Poliklinik, Hausarztpraxis, Spitex, andere)
 - Kostengutsprache
 - Mobilität des Patienten/Transport
 - Patienteninformation
- Durchführung OPAT auf der Medizinischen Poliklinik unter der Leitung Infektiologie & Spitalhygiene/Medizinische Poliklinik oder Koordination mit anderen Kliniken im Haus, Hausarzt/Spitex
 - Verabreichung der IV-Therapie
 - Wundkontrollen/Verbandswechsel
 - Organisation ambulante ärztliche Kontrollen
 - Absprache mit dem Hausarzt
- Statistische Auswertung, Dokumentation

Typische Indikationen

- Weichteilinfektionen (Erysipel, Zellulitis)
 - Osteomyelitis
 - Orthopädische Protheseninfektionen
 - Endokarditis bei stabilem Verlauf
 - Infektexazerbation bei Zystischer Fibrose
 - Infektion mit resistenten Keimen ohne perorale Therapiealternative
 u.a.m.

Typische Antibiotika

- Ceftriaxon 2g iv 1/d
 - Daptomycin 4-6mg/kg 1/d
 - Ertapenem 1g iv 1/d
 u.a.m



OPAT-Team

OPAT Pflege (MedPol)

Frau Mary-Louise Daly, Pflegefachfrau Medizinische Universitätspoliklinik
 Frau Marlis Meury, Pflegefachfrau Medizinische Universitätspoliklinik
 Frau Maria Candela, Pflegefachfrau Medizinische Universitätspoliklinik
 Frau Sabine Egli-Rüegg, Stationsleitung Medizinische Universitätspoliklinik
 Frau Bertha Ufenast, stv Stationsleitung Medizinische Universitätspoliklinik

Infektiologie

Herr Dr. Michael Osthoff, Oberarzt, Klinik Infektiologie & Spitalhygiene
 Frau Dr. Maja Weisser, stv Chefärztin, Klinik Infektiologie & Spitalhygiene

Medizinische Poliklinik

Frau Dr. Andrea Meienberg, Oberärztin, Med. Poliklinik
 Frau Dr. Katrin Bopp, Oberärztin Medizinische Poliklinik
 Frau Dr. Anna Deman, Oberärztin Medizinische Poliklinik

Pneumologie

Herr Prof. M. Tamm, Chefarzt Pneumologie
 Frau Dr. Christina Affolter, Assistenzärztin Pneumologie

