



Typ 2 Diabetes

Publikumsfragen

Frage 1

Würde es Sinn machen, bei SGLT2-Inhibitoren vor Therapiebeginn bzw. im Verlauf das c-Peptid zu messen, um das Risiko einer Ketoazidose abzuschätzen, bevor die Beta-Zellen ausgebrannt sind?

Frage 2

Kann man bei Prä-Diabetiker SGLT-2 Inhibitoren zur Gewichtsreduktion verschreiben?

Frage 3

Ist Gliclazid «out»?

Frage 4

Wann sollten Patienten mit pathologischer Glukosetoleranz therapiert werden?



Kardiovaskuläre Prävention

Publikumsfragen

Frage 1

Ist die Vergleichbarkeit der ressourcenschonenden automatisierten Office-Blutdruck-Messungen mit 24h-Blutdruck-Messungen bereits gezeigt, sodass ein Umstieg zu empfehlen wäre?

Frage 2

PCSK9 sind für die Sekundärprophylaxe nach Herzinfarkt post-hoc getestet, wäre es sinnvoll und finanziell tragbar nicht-genetische Hochrisikopatienten primär zu therapieren?

An abstract, colorful painting with various figures and shapes in shades of blue, red, yellow, and green. The style is expressive and somewhat chaotic, with overlapping colors and bold outlines. The background is white with scattered paint splatters and lines.

Palliation in der HA-Medizin

Publikumsfragen

Frage 1

Wie kann ich die Urteilsfähigkeit bei Wunsch nach Suizidunterstützung bestimmen? Gibt es dazu Tools?

Frage 2

- Wie aktiv sollen wir Patienten behandeln, wenn, nach allen therapeutischen Anstrengungen, die Patienten Sterbehilfe wünschen?