

## **Risposte alle domande più frequenti dopo un impianto percutaneo della valvola aortica TAVI**

### **Gentile paziente**

- È possibile fare nuovamente la doccia subito, il bagno di solito dopo 3 giorni.
- Con un decorso **normale** è possibile generalmente riprendere le attività dopo la dimissione dall'ospedale, incl. passeggiare, praticare hobby, fare sport, guidare l'auto, riprendere l'attività sessuale e viaggiare.
- Si consiglia di rinunciare a un maggiore sforzo fisico come il sollevamento di oggetti pesanti, ciclismo prolungato, o la sauna per circa 2 giorni.
- È importante assumere i farmaci prescritti secondo le istruzioni del vostro medico **regolarmente**.  
Procurarsi tempestivamente i nuovi farmaci in farmacia (per la prescrizione, si prega di contattare il medico di reparto).
- **Siti di puntura:** fino a quando sono morbidi e indolori, non c'è nessun problema. Possono diffondersi ematomi nel tessuto. La regressione richiede circa 2-3 settimane. Una **sutura** eventualmente applicata deve essere rimossa circa 10 giorni dopo l'intervento dal cardiologo.
- **Complicazioni rare:** nel caso in cui il sito di puntura sia molto doloroso, si gonfi in modo significativo o perda sangue, si prega di contattare il proprio medico di famiglia o il nostro cardiologo di servizio di turno dell'Ospedale Universitario di Basilea, Tel. 061 265 25 25.
- Un primo controllo con una ecografia del cuore dovrebbe essere effettuato **dopo 1 mese** all'Ospedale Universitario di Basilea o presso i cardiologi assegnati.
- **Dopo** l'intervento, nel caso di intervento odontoiatrico o colonscopia o citoscopia, devono essere assunti determinati farmaci (antibiotici) secondo il cartellino arancione della Fondazione Svizzera di Cardiologia. Maggiori informazioni possono essere fornite dai medici specificando di aver subito un intervento chirurgico alle valvole.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare i propri medici curanti.