

Cardiologia

Ospedale Universitario di Basilea
Petersgraben 4, CH-4031 Basilea
Telefono +41 61 265 44 45, Fax +41 61 265 45 98

Informativa e dichiarazione di consenso del paziente

Tilting-test

Gentile paziente

Il medico vi ha prescritto un tilting-test. Il test viene eseguito per approfondire la ragione dei collassi e dell'improvvisa perdita di conoscenza (sincope). Talvolta un tilting-test è condotto anche per approfondire lo stato di pazienti affetti da variazioni estreme della pressione sanguigna.

Procedura dell'esame e del trattamento

Prima di un tilting-test viene creato un accesso venoso. Successivamente viene condotto un ECG e applicato un bracciale per la pressione sanguigna al fine di monitorare la durata dell'esame. Secondo le indicazioni mediche può essere anche necessario monitorare la pressione arteriosa con una misurazione intra-arteriosa. L'arteria radiale è perforata nel polso con un ago sottile e viene inserito un sottile catetere per la misurazione della pressione arteriosa.

Se viene installato l'intero monitoraggio sarete legati a un lettino basculante con diverse cinghie. Successivamente, la circolazione viene monitorata per diversi minuti, quindi il lettino viene inclinato a 70 gradi. Nel corso di circa 30 minuti vengono regolarmente monitorati la pressione sanguigna e l'ECG. Cercheremo di non parlare con voi in questo intervallo di tempo e lasceremo la stanza dell'esame. Attraverso la finestra di vetro avremo sempre il contatto visivo con voi e, in qualsiasi momento, potete avvisarci se qualcosa è insolito.

Dal momento che una delle ragioni del tilting-test è la valutazione della sincope può capitare che perdiate conoscenza durante l'esame ma, essendo fissati con cinghie al lettino, non potete cadere a terra. Dopo l'esame, il lettino viene riportato in posizione orizzontale e vi potete rilassare brevemente, quindi l'intero sistema di monitoraggio viene rimosso e potete tornare a casa.

Possibili complicazioni

Complicazioni associate al tilting-test sono estremamente rare. Se viene inserita una cannula arteriosa possono apparire, sporadicamente, piccoli lividi nel sito di iniezione. Non può essere considerato una complicanza un eventuale svenimento perché spesso è innescato dall'esame.

Tra queste vi sono anche le complicazioni rare, che possono causare danni permanenti o, eccezionalmente, anche la morte.

Dopo l'esame

Se sono riscontrati risultati anomali durante il tilting-test, che richiedono ulteriori indagini o provvedimenti, discuteremo direttamente con voi le fasi successive.

Spazio per uno schizzo/note personali:

Per favore ci comunichi

se ci sono aspetti poco chiari o se ritiene importante qualcosa che non è stato menzionato in questo testo o nel colloquio personale con il medico.

Dichiarazione di consenso

Il Dottor / La Dottoressa ha avuto con il/la sottoscritto/-a un colloquio informativo conclusivo. Ho capito le spiegazioni e ho potuto porre tutte le domande di mio interesse. Dopo aver riflettuto per il tempo necessario e dopo che è stato risposto in modo completo alle mie domande, mi dichiaro disposto/-a a sottopormi all'operazione proposta. Sono pure d'accordo che si eseguano eventuali interventi di prima necessità a seguito dell'operazione stessa.

Firma paziente: _____

Firma medico: _____

Luogo e data: _____

Dichiarazione di consenso alla raccolta e alla valutazione dei dati

Acconsento alla raccolta e all'analisi dei dati scientifici relativi al mio trattamento in forma elettronica crittografata. In caso di necessità è assicurata la tracciabilità dei dati per la garanzia della qualità. Il paziente ha diritto a un accesso illimitato ai dati archiviati.

Firma del paziente:

Luogo e data: