

Kardiologie  
4031 Basel  
Tel (41 61) 265 52 25  
Fax (41 61) 265 45 98

---

# **DICHIARAZIONE DI CONSENSO**

**ALLA CHIUSURA MEDIANTE OMBRELLINO DI COMUNICAZIONI INTRACARDIACHE (DIFETTI INTERATRIALI, FORAMEN OVALE, DIFETTI INTERVENTRICOLARI)**

Sono stato/a informato/a sull'intervento a cui verrò sottoposto/a e mi dichiaro d'accordo. Sono stato/a informato/a circa lo scopo, le probabilità di successo, il rischio e le altre possibilità di trattamento.

Sono orientato/a che durante l'esecuzione del trattamento mediante catetere l'operatore, a dipendenza della situazione, utilizzerà misure particolari atte a garantire il miglior risultato possibile. In certi casi si renderà necessaria l'esecuzione di un'ecocardiografia di controllo attraverso l'esofago (ecocardiografia transesofagea) o di un esame ultrasonografico intracardiaco. Sono informato/a che in rari casi il posizionamento dell'ombrellino non sarà possibile e che si renderà necessario un intervento chirurgico in urgenza o elettivo. In rari casi (meno dell'1%) l'ombrellino può dislocarsi dalla sua posizione ciò che rende necessario il suo ricupero dal cuore o dalla circolazione mediante speciali strumenti o mediante un intervento chirurgico. Rare complicazioni sono le embolie d'aria nelle arterie o una lesione vascolare. Queste complicazioni si manifestano in meno dell'1% dei casi. Sono informato/a che dopo l'impianto di un ombrellino possono manifestarsi dei disturbi del ritmo che in certi casi necessitano un trattamento farmacologico. Dopo l'intervento verrà prescritta una terapia antitrombotica per 6 mesi.

Sono orientato/a che in pochi casi può restare una comunicazione residua tale da giustificare un secondo trattamento.

Sono stato/a orientato/a sui rischi generali del cateterismo cardiaco tra i quali i sanguinamenti nella sede di punzione e/o in certi casi il cateterismo può portare all'apparizione di disturbi del ritmo necessitanti trattamento.

Altre serie complicazioni (allergie ai medicinali somministrati, disturbi della circolazione cerebrale, renale ed alle gambe legata alla formazione di piccoli coaguli) sono molto rari e non superano l'1% delle indagini.

Tenuto conto di un piccolo rischio di infezione batterica verrà somministrato un antibiotico durante l'intervento. Un trattamento antibiotico è pure necessario durante i primi mesi dopo l'impianto in caso di interventi dentari o di febbre di origine non chiara.

Ho compreso le informazioni che mi sono state date. A tutte le mie domande è stata data risposta soddisfacente.

Firma del/della paziente:

Firma del medico:

---

---

Luogo/data:

Luogo/data:

---

---