

Schéma d'application

Application de pommade nasale

Traitement spécial de la peau avant l'opération

La préparation spécifique de la peau avant une intervention chirurgicale est une partie importante de la préparation préopératoire. Des produits qui ont fait leurs preuves quant à la réduction des germes sur la surface de la peau sont à votre disposition sur le marché. Vous pouvez activement participer à cette réduction de germes avant l'opération.

Date de l'opération	
Commencement du traitement prophylactique de la peau (4 jours avant l'opération)	

Schéma d'application

Produit	Comment	Matin	Midi	Soir
Bactroban® Nasal	Déposer une petite quantité sur un coton-tige à usage unique et appliquer le à l'intérieur de chaque narine (voir au dos).	x		x
Dentohexin® (Chlorhexidin- Solution 0.2%)	Matin, midi et soir, après les repas, de préférence 15 minutes après vous avoir brossé les dents, rincez et gargarisez durant 20 secondes votre bouche avec 10ml de Dentohexin® 0.2% solution non diluée .	x	x	x
Lifoscrub®	Lifo-Scrub s'utilise lors de la douche ou du bain, comme un gel douche ou un shampoing normal. Laissez agir durant 2 min. Ensuite, rincez et séchez. A utiliser une fois par jour, soit le matin, soit le soir.	(x)	ou	(x)

Pour toutes vos demandes, veuillez prendre contact avec le service d'hygiène hospitalière
Téléphone : 061 328 68 52 du Lundi au vendredi de 08.00 h. - 17.00 h.



Prof. Dr. A.F. Widmer
Leiter, Abteilung für Spitalhygiene



Prof. Dr. F. Eckstein
Chefarzt Herzchirurgie

Schéma d'application

Application de pommade nasale

Image. 1 Application de la pommade sur un coton-tige (exemple)




Image. 2 Application du coton-tige dans chaque narine



Application correcte du Bactroban® Nasal

Déposer une petite quantité (taille d'une tête d'allumette) sur un coton-tige à usage unique et appliquer le à l'intérieur de chaque narine.

Presser les narines entre le pouce et l'index le long des parois du nez pour bien étaler l'onguent dans toutes les régions du nez. Un petit massage des narines peut favoriser cette dispersion.

Après l'application, le coton-tige est jeté pour éviter une contamination.

Le tube de Bactroban® Nasal doit être refermé.
