


Operationen am Kopf

Neurochirurgische Operationen am Kopf

Empfehlung für die Nachbehandlung



Neurochirurgische Operationen am Kopf

0. – 6. Woche

Orthese	Keine
ROM	Frei
Belastung	Langsamer Belastungsaufbau Limitation: Blutdrucklimiten, extraventrikuläre Drainage, Redon
Physiotherapie	Atemtherapie Lagerungsinstruktion Mobilisation: Bettrand, Lehnstuhl, Therapiestuhl, Rollstuhl Gangschule Sensomotorisches Training (passives und aktiv-assistives Bewegungen, tonusregulierende Massnahmen) Hilfsmittelanpassung
Ergotherapie	Selbsthilfetraining
Sport	Nach Rücksprache mit Arzt/Therapeut

Bei diesen Angaben handelt es sich um allgemeingültige Richtlinien; bitte schriftliche chirurgische Verordnung beachten. Die Sportaufnahme erst, wenn es die funktionelle Testung erlaubt und sie von ärztlicher Seite freigegeben wird. Die Erlaubnis zur selbständigen Fahrzeuglenkung wird durch den Arzt individuell festgelegt.

Alltagsaktivitäten fördern: diese sollten eine Mindestdauer von 10 Minuten haben und jeden Tag mindestens 30 Minuten durchgeführt werden (Buckley et al. 2015, Pulsford et al. 2015).