

## Verabreichung der Medikamente bei stationärer Gabe im Zusammenhang mit der Hämodialyse

### Grundsätze:

- Die Gabe der Medikation wenn möglich auf den Abend konzentrieren
- Verabreichungsstatus muss von der Abteilung oder Dialyse, vor dem Transport/Rücktransport in MEONA dokumentiert werden
- Wenn um 06.00 Uhr Tabletten verabreicht werden müssen, soll PPI (Pantozol) bereits mit denen gegeben werden

Medikament	Kommentar	Verabreichungsintervall	Verabreichungszeiten	Verabreichung durch
<b>Antibiotika</b> Hier gilt prioritär die <a href="#">Tabelle im Weissbuch der Infektiologie</a> in Bezug auf die Dosierung und den Zeitpunkt der Antibiotikagabe	i.v. und p.o.	1x tgl.	Abends (18.00)	Abteilung
	i.v. und p.o. <b>nach Dialyse</b>	2 x tgl.	06.00 / 18.00 Ladedosis abends nach Hämodialyse	
	i.v. / p.o. <b>nach Dialyse</b>	3 x tgl. bei Dialyse <b>am Morgen</b>	06.00 / 14.00 / 22.00	
	i.v. /p.o. <b>nach Dialyse</b>	3 x tgl. bei Dialyse <b>am Nachmittag</b>	06.00 / <b>12.00</b> / 22.00	
		4 x tgl.	06.00 / 12.00 / 18.00 / 24.00	
<b>Antidepressiva</b>	auf Dialyse mitgeben		Individuelle Zeiten möglich oder Gabe abends	Dialyse/Abteilung
<b>Antidiabetika, orale</b>	Bei einem BZ<6.5 werden die OAD nicht verabreicht zur Vermeidung der Hypoglykämie		Individuelle Zeiten möglich	Dialyse/Abteilung
<b>Antidiabetika, Insuline</b>	auf Dialyse mitgeben			Dialyse

Medikament	Kommentar	Verabreichungsintervall	Verabreichungszeiten	Verabreichung durch
<b>Herztherapeutika</b> Antihypertonika	Keine Gabe vor Dialyse zur Vermeidung der Hypotension		Individuelle Zeiten möglich	Dialyse/Abteilung
Beta-Blocker	Mitgeben, oder zu normalen Zeiten verabreichen			
Diuretika	Keine Gabe vor Dialyse			
Gutron (Antihypotonikum)	Mitgeben, oder zu normalen Zeiten verabreichen			
<b>Cortison</b>	zu normalen Zeiten verabreichen			Dialyse/Abteilung
<b>Immunsuppressiva</b>	zu normalen Zeiten verabreichen im Abstand von 12 Stunden			Dialyse/Abteilung
<b>Neuroleptika, Anti-Parkinsonmittel</b>	Mitgeben, oder zu normalen Zeiten verabreichen		Individuelle Zeiten möglich	Dialyse/Abteilung
<b>Phosphatbinder</b>	Direkt vor dem Essen einnehmen, nicht mitgeben			Dialyse
<b>Schmerzmittel</b> (Paracetamol, Metamizol, Opioide)	i.v. und p.o. <b>vor Dialyse</b>	6 stündlich oder je nach Verordnung	06.00/ 12.00 /18.00 / 24.00	Abteilung
<b>Schmerzmodulatoren</b> (Gabapentin, Pregabalin)	Gabe abends			
<b>Vitamine</b> Calcitriol	auf Dialyse mitgeben, keine doppelte Gabe			Dialyse