

Liste: Haltbarkeit nach Anbruch

Prüfung und Genehmigung

| Funktion: | Name: | Datum: | Unterschrift: |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Autor | S. Späni | | |
| Leiter Pharmalogistik und Prozesse | Dr. H. Plagge | | |
| Leiter Klinische Pharmazie | D. Bornand | | |
| Leiter Qualitätssicherung | Dr. S. Deuster | | |

Historie und Gültigkeitsdauer

**Die vorliegende Liste ersetzt die Version LL0030-V07, gültig ab: 20.10.2015
Diese Liste ist gültig bis zur nächsten Revision, längstens jedoch bis 2 Jahre nach
dem Gültigkeitsdatum gemäss Kopfzeile**

Übergeordnete und Mitgeltende Dokumente

| Dokumenten-Nr.: | Titel | Ausgabedatum |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| RL0023-V05 | Listen | 10/2012 |
| | Arzneimittel - Kompendium der Schweiz | Onlineversion |
| | NRF | 01/2012 [1] |
| RL0029-V03 | Richtlinie Stabilität | 06/2010 [2] |

Verteiler

- Autorisierte Kopien gemäss Verteilerliste
- Informationskopien an:
 - Pflegepersonal
 - alle Stationen aller Kliniken

Beilagen

- Haltbarkeit nach Anbruch, Dokumenten-Nr.: LL0030-V08-B01

Die Angaben dieser Liste wurden nach bestem Wissen zusammengetragen, es kann jedoch keine Garantie über die Richtigkeit der Angaben übernommen werden.

Copyright Spital-Pharmazie 2018

Diese Liste darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors nicht kopiert und in andere Websites oder Medien übernommen werden.

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Datum: | 29.01.18 |
| Seite: | 2 von 3 |
| Gültig ab: | siehe Deckblatt |
| Autorisierte Kopie Nr.: | siehe Deckblatt |
| Dokumentennummer: | LL0030-V08.doc |

Haltbarkeit nach Anbruch
Liste
Zeichenerklärung

| | | | |
|-----------|-----------------------------------|------|---------------------------|
| g | Gramm | mg | Milligramm |
| Gran | Granulat | ml | Milliliter |
| Gtt Opht | Augentropfen | RT | Raumtemperatur (15-25 °C) |
| KS | Kühlschrank (Lagerung bei 2-8 °C) | Susp | Suspension |
| Lagertemp | Lagertemperatur | Temp | Temperatur |
| Lsg / Lös | Lösung | | |

Wichtige Hinweise

- ⇒ Das angegebene Verfalldatum des Herstellers darf generell nicht überschritten werden. Dies gilt sowohl für die angebrochene und nicht angebrochene Packung
- ⇒ Sollte sich ein Arzneimittel im Laufe der Zeit verändern (z.B. Farbänderung oder vorher nicht vorhandene Trübung), so ist dieses nicht mehr zu verwenden
- ⇒ Auf Mehrdosenbehältnissen ist das Anbruchdatum und die daraus resultierende Verwendbarkeitsfrist oder das neue Verfalldatum zu vermerken. Unterstützend können die roten Anbruchetiketten (Art. 1109660 des Zentralmagazins) verwendet werden, die zusätzlich noch den Anbruch klar kennzeichnen und so Mehrfachanbrüche vermeiden helfen.
- ⇒ Allgemein sollten Arzneimittel nach Anbruch lichtgeschützt (im Umkarton) und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahrt werden und nach Gebrauch wieder gut verschlossen werden
- ⇒ Die Aufbrauchsfrist gilt bei auf Station herzustellenden Arzneiformen (z.B. Pulver zur Herstellung einer Suspension) immer ab dem Zeitpunkt der Herstellung/Auflösung
- ⇒ Grundsätzlich gelten die Aufbrauchsfristen in dieser Liste. Falls keine Angaben zu dem gesuchtem Arzneimittel zu finden sind, gelten die folgenden allgemeinen Aufbrauchsfristen nach Anbruch:

Allgemeine Aufbrauchsfristen nach Anbruch [1,2]

| | |
|--|--|
| Konservierte flüssige Zubereitungen zum Einnehmen oder zur Anwendung in der Mundhöhle (Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Tropfen, Sirupe) Suspensionen und Emulsionen immer vor Gebrauch gut schütteln | 6 Monate [1,2] |
| Konservierte flüssige Zubereitungen zur äusseren Anwendung (z.B. Shampoos) | 6 Monate [1,2] |
| Konservierte Inhalationslösungen | 4 Wochen [1,2] |
| Spüllösungen steril (unkonserviert und konserviert) | zum Einmalgebrauch [2] |
| Injektionslösungen und Infusionslösungen nach Anstechen und / oder Zumischen versch. Komponenten | Lösung sofort verabreichen und je nach Haltbarkeit der Wirkstoffe verwenden (gemäss Angaben im Arzneimittelkompendium), nach max. 24 Stunden verwerfen |
| Augentropfen und Augensalben in Mehrdosenbehältern | max. 4 Wochen ; nur für einen Patienten verwenden; die Tropfspitze immer sauber halten und nicht berühren [1,2] |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Datum: | 29.01.18 |
| Seite: | 3 von 3 |
| Gültig ab: | siehe Deckblatt |
| Autorisierte Kopie Nr.: | siehe Deckblatt |
| Dokumentnummer: | LL0030-V08.doc |

Haltbarkeit nach Anbruch

Liste

| | |
|---|--|
| Augentropfen und Augengel in Einzeldosenbehältnissen (SDU) | zum Einmalgebrauch. Nach Öffnen des Beutels sind übriggebliebene Einzeldosen nach 1 Monat zu vernichten. |
| Nasentropfen | 2 Wochen [1,2] |
| Nasenspray | 6 Monate [1,2] |
| Zubereitungen zur Anwendung am Ohr | 4 Wochen ; nur für einen Patienten verwenden [1] |
| Insuline | <p>alle angebrochenen Insulin-Ampullen sind bei RT max. 4 Wochen nach dem ersten Anstechen haltbar. Sie dürfen nicht im Kühlschrank und nicht bei Temperaturen über 30°C aufbewahrt werden, das heisst eine Lagerung im Arzneimittelschrank unter Lichtschutz ist notwendig.</p> <p>Im USB wurde für alle verwendeten Insuline eine Haltbarkeit nach Anbruch von 4 Wochen definiert. Diese Angabe kann von der Haltbarkeitsangabe der Fachinformation abweichen.</p> |
| Salben und Cremes | <p>6 Monate; (aus hygienischer Sicht Festlegung der verkürzten Haltbarkeit nach Anbruch, auch gemäss Fachinformationen Deutschland, Vereinheitlichung mit oralen Lösungen)</p> <p>Anwendung am Auge: siehe Augensalben, Augengel</p> |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|--|------------|----------------------|---------------------|---|
| 9008596 | 3TC Trink Lös 10 mg/ml o alkohol 240 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9121318 | 5-AMINOLÄVULINSÄURE HCL 2 g | KS | 2 Stunden (Lösung) | KS | |
| 9008447 | ALCAINE Gtt Opht 15 ml | KS | 4 Wochen | KS | |
| 9120602 | ALGIFOR Junior Susp 100 mg/5ml 200 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9022552 | ALPHAGAN Gtt Opht 5 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9086430 | AMOXICILLIN Sandoz Gran 200 mg/4ml f Sus FI 100 ml | RT | 14 Tage (Suspension) | KS | |
| 4002600 | AMPHO MORONAL Susp 10 % 24 ml | RT | 3 Monate | RT | |
| 9119760 | AMUKINA Lös Plast FI 1000 ml | RT | 3 Monate | RT | Lösung nicht mit Metall in Berührung bringen; kann Kleidung bleichen |
| 4003853 | ATROPINE SDU Faure 0.5 % 20 Monodosis 0.4 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Monodosen innerhalb von 4 Wochen verwenden |
| 9026526 | ATROVENT Inhal Lös 250 mcg/ 2 ml 60 Monodosis 2ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Lichtschutz einhalten, bei RT haltbar bis Verfalldatum |
| 9083334 | BECETAMOL Tropfen 20 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4002709 | BEPANTHEN Lös 5 % 100 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9078828 | BEPANTHEN Lös.5% Lidocain1% Mundspüllösung | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9009223 | BEPANTHEN Nasensalbe 5% 5 G | RT | 7 Tage | RT | |
| 4003123 | BETADINE Lös 1:10 in NaCl 0.9% 250 ml | RT | Einmalgebrauch | / | |
| 9141508 | BETADINE Lösung standardisiert 1000 ml | RT | ganze Laufzeit | RT | |
| 9019978 | BETADINE Lösung standardisiert 120 ml | RT | ganze Laufzeit | RT | |
| 4003128 | BETADINE Seife liq 500 ml | RT | ganze Laufzeit | RT | |
| 9099431 | BETOPTIC S single dose GttOpht 60x0.25ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Lichtschutz einhalten, bei RT haltbar bis Verfalldatum; vor Gebrauch gut schütteln |
| 9017966 | BEXIN Sirup 25 mg/10ml 150 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9006080 | BEXIN Tropfen 20.8 mg/ml 20 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 13% Vol Alkohol |
| 9092010 | BRAMITOB Inhal Lös 300 mg/4ml Amp | KS | Einmalgebrauch | RT/KS | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Lichtschutz einhalten, bei RT haltbar bis zu 3 Monate; im KS haltbar bis Verfalldatum |
| 4000456 | BRAUNODERM Aik.Lös. farblos 1000ml Braun | RT | 6 Monate | RT | |
| 9121563 | BRAUNODERM Alkoholische Lösung farblos 100 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9070076 | BSS Lösung 50 x 25 ml | RT | Einmalgebrauch | / | |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|--|------------|--------------------------|---------------------|---|
| 9102454 | BSS Plus 6 x 500 ml | RT | Einmalgebrauch | / | |
| 4003552 | BUCCO TANTUM liq 200 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 10.7% Vol Alkohol |
| 9106264 | CARBOVIT Suspension 150 mg/ml oral FI 100 ml | RT | Einmalgebrauch | / | |
| 9045954 | CELLCEPT Susp 200 mg/ml FI 175 ml | RT | 2 Monate (Suspension) | RT | |
| 9136325 | CERUMENOL Gtt Auric 11 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9067427 | CHLORAMIN Spüllösung 0.1 % 100 ml | RT | Einmalgebrauch | / | |
| 9109977 | CHLORHEXIDIN Tinktur 2% 500 ml | RT | 1 Jahr | RT | |
| 9054315 | CHLORHEXIDIN-D MSPül 100 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9036037 | CIPROXIN HC Susp Auric 10 ml | RT | 14 Tage | RT | |
| 9034179 | CIPROXIN Susp 5 g/100ml 100 ml | RT | 14 Tage | RT | nicht auf dem Kopf gestellt lagern |
| 9058745 | CITRAT Trinklösung FI 30 ml | RT | 24 h | RT | |
| 9055364 | CLEXANE MULTI Lös 300 mg/3ml Stechamp 3 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9126011 | CLINDAMYCIN Pfizer Gran 75mg/5ml FI 80ml | RT | 2 Wochen | RT | |
| 4003201 | CLOPIXOL Tropfen 20 mg/ml 20 ml | KS | 6 Wochen | RT | nur mit Wasser, Apfel-, oder Orangensaft mischen; enthält 14,2% Vol Alkohol |
| 9146296 | CO-AMOXI Mepha Plv 312.5 mg | RT | 7 Tage (Suspension) | KS | vor Gebrauch gut schütteln |
| 9146293 | CO-AMOXI Mepha Plv 457 mg | RT | 7 Tage (Suspension) | KS | vor Gebrauch gut schütteln |
| 9097580 | COFFEINCITRAT Injektion 20 mg/ml 10x5ml | RT | Einmalgebrauch | / | auch zur peroralen Anwendung |
| 9010837 | COLLUNOSOL N Nebul 50 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 5% Vol Alkohol |
| 9089245 | COSOPT S Gtt Opht 60 Monodoses 0.2 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Monodosen innerhalb von 15 Tagen verwenden |
| 9008586 | CYCLOGYL Gtt Opht 0.5 % 10 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 4000554 | CYCLOGYL Gtt Opht 1% 10 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9023090 | DAFALGAN Sirup 3 % Inf 90 ml | RT | 3 Monate | RT | |
| 9091895 | DALACIN T Aknelösung 1 % 60 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9019699 | DENTOHEXIN Lös 200 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9050442 | DENTOHEXIN Rachenspray 50 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9055288 | DESOMEDIN DD Gtt Opht 10 x 0.6 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Monodosen innerhalb von 4 Wochen verwenden |
| 9074876 | DEXAFREE UD GttOpht 0.1% 20Monodos 0.4ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen des Sachets Monodosen innerhalb von 5 Tagen verwenden; Lichtschutz einhalten |
| 9007366 | DIFLUCAN Susp 10 mg/ml 35 ml | RT | 14 Tage | RT | |

Rückfragen sind an den Dienstapotheker der Klinischen Pharmazie zu richten (Tel. 061 / 265 29 13 oder intern 87913).

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------|--|
| 9052639 | DIMETHYLIS sulfoxidum (DMSO) 100g | RT | 6 Monate | RT | für die Behandlung eines Patienten; Rest verwerfen |
| 4003647 | DIPROSALIC Lös 30 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9104859 | DISTRANEURIN Mixtur 50 mg/ml 300 ml | KS | 4 Monate | KS | nicht einfrieren; Beimischungen vermeiden |
| 9096215 | DORMEASAN Tropfen 50 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 62% Vol Alkohol |
| 9046336 | DOSPIR Inhal Lös 60 x 2.5 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Lichtschutz einhalten, bei RT haltbar bis Verfalldatum |
| 9126723 | DUPHALAC Sirup FI 500 ml | RT | 6 Monate | RT | Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9012135 | ELOCOM Lös 0.1 % 30 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9061990 | EMOFLUOR Mundspülung 250 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9142668 | EMOFRESH Mundbefeuchter Tb 75 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4002820 | ESSIG-WEINSAURE-TONERDE Lös 3% 500 ML | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9087591 | FENIALLERG Tropfen 1 mg/ml 20 ml | RT | 6 Monate | RT | Lichtschutz einhalten |
| 9134676 | FLAGYL Susp 25 mg/ml FI 120 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 1% Vol Alkohol |
| 9106876 | FLATULEX Trpf 41.2mg/ml Dosierpumpe 50ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4004029 | FLECTOR EP TISSUGEL Pflaster 10 Stk | RT | 3 Monate | RT | nach Öffnen des Beutels Pflaster innerhalb von 3 Monaten verwenden |
| 4003615 | FLOXAL Augensalbe 0.3 % 3 g | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9106512 | FLUORESCINE 2% Minims 10mg/0.5ml DU | RT | Einmalgebrauch | / | Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9036882 | FLUORESCINE Oxybupro 0.4 % 20 Monodosi 0.4 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 4 Wochen verwenden |
| 4002839 | FML NEO LIQUIFILM Gtt Opt 5 ml | RT | 4 Wochen | RT | Flasche aufrecht lagern; vor Gebrauch gut schütteln |
| 9131837 | FUCITHALMIC Tropfgel 5 g | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9060047 | GLYCEROL steril 50 ml | RT | Einmalgebrauch | / | |
| 9126314 | HALDOL Tropfen 2 mg/ml 30 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9056481 | HEPARIN NA Braun 25000 E/5ml Stechamp 5 ml | RT | 14 Tage | RT | Lösung unter sterilen Bedingungen entnehmen; nur verwenden, wenn die Lösung klar ist |
| 9023699 | HUMALOG Inj Lös 100 IE/ml Pen 5 Amp 3ml | KS | 4 Wochen | RT | Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9089274 | HYDROMORPHONI HCL Streuli Tr 1mg/ml 50ml | RT | 4 Wochen | RT | Lichtschutz einhalten; enthält 1,2% Vol Alkohol |
| 4003216 | IMODIUM Sirup 100 ml | RT | 6 Monate | RT | Lichtschutz einhalten |
| 9134686 | INFECTOMYCIN Plv 200 mg/5ml Susp 100 ml | RT | 14 Tage | KS | |
| 9105216 | INFECTOTRIMET Saft 50mg/5ml FI 75ml | KS | 2 Monate | KS | |
| 9137702 | INSULIN ACTRAPID HM 100 E/ml | KS | 4 Wochen | RT/KS | bei RT haltbar bis zu 4 Wochen, im KS haltbar bis zu 3 Monate; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|---|------------|-------------------------|---------------------|--|
| 9008816 | INSULIN HUMALOG Inj Lös Stechamp 10 ml | KS | 4 Wochen | RT | nach Anbruch nicht mehr im Kühlschrank aufbewahren; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9007084 | INSULIN Insulatard HM Amp 10 ml | KS | 4 Wochen | RT/KS | bei RT haltbar bis zu 4 Wochen, im KS haltbar bis zu 3 Monate; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9059018 | INSULIN LANTUS für Optipen Amp 3 ml | KS | 4 Wochen | RT | nach Anbruch nicht mehr im Kühlschrank aufbewahren; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9058465 | INSULIN LEVEMIR Penfill Inj Lös Amp 3 ml | KS | 4 Wochen | RT | nach Anbruch nicht mehr im Kühlschrank aufbewahren; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9049793 | INSULIN NOVOMIX 30 Penfill Inj Lös Amp 3 ml | KS | 4 Wochen | RT | nach Anbruch nicht mehr im Kühlschrank aufbewahren; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9052817 | INSULIN NOVORAPID Inj Lös Amp 10 ml | KS | 4 Wochen | RT | nach Anbruch nicht mehr im Kühlschrank aufbewahren; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9144300 | IRENAT Tropfen | RT | 26 Wochen | RT | |
| 4001936 | ISOKET Dosieraeros 15 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 85% Vol Alkohol |
| 9090638 | KALETRA Sirup 60 ml | KS | 6 Wochen | RT | enthält 42% Vol Alkohol |
| 4002761 | KALIUMPERMANGANAT LÖSUNG 5% 100 ML | RT | 6 Monate | RT | |
| 9082287 | KA-VIT Tropfen 5 ml | RT | 3 Monate | RT | |
| 9073747 | KEPPRA Lös 10 % 300 ml | RT | 7 Monate | RT | |
| 9146421 | KETALGIN Lös 10 mg/ml 1 Lt | RT | 3 Monate | RT | Entnahme mit separater Pumpe |
| 9013024 | KLACIPED Susp 125 mg/5ml 100 ml | RT | 14 Tage (Suspension) | RT | |
| 9009633 | LACRINORM Augengel 10 g | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9117131 | LAVASEPT Lös FI 250 ml | RT | 6 Wochen | RT | |
| 9081019 | LAXOBERON Abführtropfen 30 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9134750 | LENOXIN Liquidum Lös 60 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 10% Vol Alkohol |
| 9085682 | LIFO SCRUB Waschlotion 100 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9060606 | LIFO SCRUB Waschlotion Ovalflasche 500 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9044058 | LOCOID CRELO Emuls 0.1 % 30 g | RT | 6 Monate | RT | |
| 4000963 | LUBEX Extra Mild liq Ph 5.5 150 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4000683 | MALTOFER Tropfen | RT | 6 Monate | RT | |
| 9137475 | MELATONIN Trinklösung 5 mg/ml | RT | ganze Laufzeit | RT | Lichtschutz einhalten |
| 9057164 | METHACHOLIN Inh Lös 4 % FI 2 ml | KS | 24 Stunden | KS | |
| 4001720 | METHADON HCL Trinklösung 10 mg/ml 50 ml | RT | 3 Monate | RT | Entnahme mit Oraldispenser (zum einmaligen Gebrauch bestimmt) |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|--|------------|----------------------|---------------------|--|
| 9071811 | METHOCEL Gtt Opht 2 % 10 g | RT | 3 Monate | RT | Flasche auf dem Kopf stehend lagern; Lichtschutz einhalten |
| 9026298 | MIACALCIC Nasenspray 200E/Dosis | KS | 4 Wochen | RT | angebrochene Spraybehälter aufrecht stehend lagern |
| 9107072 | MICROPAQUE Susp 500 ml | RT | 6 Monate | RT | bei Sedimentation vor Gebrauch gut schütteln |
| 9050640 | MIDAZOLAM Trinklösung 2 mg/ml 100 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9036094 | MINIRIN Nasenspray 6 ml | RT | 2 Monate | RT | angebrochene Spraybehälter aufrecht stehend lagern |
| 9024482 | MORPHIN HCL Trinklösung 1mg/ml 30 ml | RT | 6 Monate | RT | Entnahme mit Oraldispenser (zum einmaligen Gebrauch bestimmt) |
| 9006208 | MORPHIN HCL Trinklösung 20mg/ml 30 ml | RT | 6 Monate | RT | Entnahme mit Oraldispenser (zum einmaligen Gebrauch bestimmt) |
| 4003651 | MOTILIUM Susp 1 mg/ml 200 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9118587 | MUNDISAL Gel o Zucker 10 g | RT | 1 Jahr | RT | enthält 43% Vol Alkohol |
| 9069177 | NASIVIN PUR Dosierspray 0.025 % 10 ml | RT | 1 Jahr | RT | |
| 9069178 | NASIVIN PUR Dosierspray 0.05 % 10 ml | RT | 1 Jahr | RT | |
| 9047656 | NASIVIN Tropfen 0.01 % Bébé 5 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9050828 | NASIVIN Tropfen 0.025 % Inf 10 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9032426 | NASIVIN Tropfen 0.05 % Ad 10 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9107677 | NASONEX Dosier Nasenspray 50 mcg 140 Dos | RT | 2 Monate | RT | |
| 9016029 | NATRIUM BENZOAT TrinkLsg. 100mg/ml 200ml | RT | ganze Laufzeit | RT | |
| 9092946 | NEOSYNEPHRIN-POS 5% Gtt Opht 10ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9012329 | NERVIFENE liq neue Formel 125 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9035550 | NEURODOL TISSUGEL Pfl 10 Stk | RT | 3 Monate | RT | nach Öffnen des Beutels Pflaster innerhalb von 3 Monaten verwenden |
| 4001135 | NIZORAL Shampoo 20 mg 100 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9142166 | NOFIL Sirup Inf 100 ml | RT | 4 Wochen | RT | vor Gebrauch gut schütteln |
| 9143354 | NOVALGIN Tr 100 ml | RT | 12 Monate | RT | |
| 4001145 | NOVALGIN Tropfen 10 ml | RT | 12 Monate | RT | |
| 4001827 | NOZINAN Tropfen 4 % 30 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 15% Vol Alkohol |
| 9090334 | OCTENIDERM Lös farblos 1 lt | RT | 6 Monate | RT | |
| 9088629 | OCTENIDERM Lös farblos mit Verschluss 250 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9068495 | OCTENISEPT Lös farblos FI 250 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9085776 | OCTENISEPT Lös farblos FI 500 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4002847 | OCULOSAN Gtt Opht 10 ml | RT | 4 Wochen | RT | |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|---|------------|-------------------------|---------------------|---|
| 9138968 | OLIVENÖL Ph. Eur. 100 ml Hänsseler | RT | 6 Monate | RT | |
| 4002101 | OPIUMTINKTUR Tropfen 30 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9131528 | ORFIRIL Sirup 300 mg/5ml 250 ml | RT | 3 Monate | RT | nicht mit kohlenensäurehaltigen Getränken einnehmen |
| 9142305 | OTRIVIN Natural Spray 210 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9125551 | OXYCODON Trinklösung 1 mg/ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9061488 | OXYNORM Tropfen 10 mg/ml FI 30 ml | RT | ganze Laufzeit | RT | |
| 9046320 | PARAGOL N Emuls 500 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9012005 | PASPERTIN TROPFEN 100 ML | RT | 6 Monate | RT | |
| 9128650 | PODOMEXEF Gran 40 mg/5ml Inf für Trinksusp 100 ml | RT | 10 Tage (Suspension) | KS | |
| 9107627 | PONSTAN Susp 50 mg/5ml 125 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4003691 | PRED FORTE Gtt Ophth 1 % 5 ml | RT | 4 Wochen | RT | vor Gebrauch gut schütteln; Tropfflasche aufrecht lagern |
| 9131529 | PROCUTOL Haut Waschlotion 175 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9082750 | PRONTOSAN Wundreinigung Gel FI 30 ml | RT | 2 Monate | RT | |
| 9113951 | PRONTOSAN Wundspüllösung steril 350 ml | RT | 2 Monate | RT | |
| 9017678 | PRURI-MED Emuls 150 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9008154 | PSYCHOPAX Tropfen 20 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 38% Vol Alkohol |
| 9012926 | PULMICORT Inhal Lösung 0.25 mg/ml 20 Respule 2 ml | RT | 12 Stunden | RT | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 3 Monaten verwenden; Lichtschutz einhalten; aufrecht lagern |
| 4003609 | PULMICORT Inhal Lösung 0.5 mg/ml 20 Respule 2 ml | RT | 12 Stunden | RT | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 3 Monaten verwenden; Lichtschutz einhalten; aufrecht lagern |
| 4002018 | RESYL PLUS Tropfen 20 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 53% Vol Alkohol |
| 9062417 | RETINORAL Gel Tb 5 g 5 Stk | KS | ganze Laufzeit | KS | |
| 4004026 | RETROVIR AZT Sirup 10 mg/ml 200 ml | RT | 6 Monate | RT | Lichtschutz einhalten; nicht mit Lebensmitteln oder anderen Arzneimitteln mischen |
| 9087844 | RIFADIN Sirup 100mg/5ml FI 120ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9146440 | RISPERIDON Mepha Lösung 1 mg/ml | RT | 6 Monate | RT | keine Gabe mit Tee |
| 9115360 | RIVOTRIL Tropfen 2.5 mg/ml 10 ml | RT | 4 Monate | RT | Lösung ist blau gefärbt |
| 9074796 | SACCHAROSE Trinklösung 20% 15ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 4002895 | SALVIA Wild Tropfen 50 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 40% Vol Alkohol |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|--|------------|----------------------|---------------------|---|
| 4003898 | SANDIMMUN NEORAL Trink Lös 100 mg 50 ml | RT | 2 Monate | RT | möglichst nicht unter 20°C lagern, sonst Verdickung (reversibel); kein Grapefruitsaft zum Verdünnen verwenden; Pipette nicht mit Verdünnungsflüssigkeit in Berührung bringen; enthält 12% Vol Alkohol |
| 4001393 | SCHILLER LOESUNG 100 ML | RT | 6 Monate | RT | |
| 4002832 | SCOPOLAMINE Dispersa Gtt Opht 0.25 % 10 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9131503 | SKINMAN SOFT Prot alk Händedesinfektion 100ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 89% Vol Alkohol |
| 9145347 | SKINMAN SOFT Prot alk Händedesinfektion Disp 500ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 89% Vol Alkohol |
| 9126614 | SOFTASEPT N gefärbt Hautdesinfekt 250 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 74% Vol Alkohol |
| 9117219 | SOFTASEPT N gefärbt Hautdesinfekt 1000ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 74% Vol Alkohol |
| 9137223 | SOIN DE BOUCHE Bichsel 100 ml | RT | 24 Stunden | RT | |
| 9134803 | SOLUPRED Trink Lös 1 mg/ml FI 50 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 4% Vol Alkohol |
| 9121516 | SONNENBLUMENÖL 30 ml 20 Stk | RT | 6 Monate | RT | |
| 4002825 | SPERSACARPINE Gtt Opht 2 % 10 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9112541 | SPERSAPOLYMYXIN Gtt Opht 5 ml | KS | 4 Wochen | KS | |
| 9070703 | STERILLIUM CLASSIC PureHändedesinf 100ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9071159 | STERILLIUM CLASSIC PureHändedesinf 500ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9087623 | STERILLIUM PURE Händedesinfektion Gel FI 475 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4003255 | SURMONTIL Tropfen 4 % 30 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 11% Vol Alkohol |
| 4002316 | SYNTOCINON Spr 40 E/ml 5 ml | KS | 4 Wochen | RT | |
| 9121170 | TAMIFLU Plv 6 mg/ml für Susp FI 13 g | RT | 17 Tage / 10 Tage | KS / RT | |
| 9067546 | TANNO HERMAL Schüttelmixtur Lot FI 100 g | RT | 6 Monate | RT | |
| 4001860 | TEGRETOL Susp 2 % 250 ml | RT | 3 Monate | RT | Lichtschutz einhalten |
| 4003258 | TELEBRIX GASTRO Lös FI 100 ml | RT | 24 Stunden | RT | vor Röntgenstrahlen schützen |
| 9032445 | TENAPHIN BLAU Lös 10 mg/ml 50 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9053484 | TENAPHIN ROT Lös 5 mg/ml 50 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9013355 | TETRACAINE SDU Faure 1 % 20 Monodosen 0.4 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie Monodosen innerhalb von 4 Wochen verwenden |
| 9099581 | TIMISOL SDU Gtt Opht 0.25% | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen des versiegelten Beutels Monodosen innerhalb von 6 Monaten verwenden |
| 9037933 | TIMISOL SDU Gtt Opht 0.5% | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen des versiegelten Beutels Monodosen innerhalb von 6 Monaten verwenden |
| 9011438 | TOBRADEX Augensalbe | RT | 4 Wochen | RT | |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------|--|
| 9013388 | TOBRADEX Gtt Opht | RT | 4 Wochen | RT | vor Gebrauch gut schütteln |
| 4003940 | TOBEX Augensalbe | RT | 4 Wochen | RT | |
| 4002856 | TOBEX Gtt Opht 5 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9081801 | TOPLEXIL N Sirup ohne Zucker 150 ml | RT | 6 Monate | RT | Lichtschutz einhalten |
| 4001702 | TRAMAL Tropfen 100 mg/ml 10 ml | RT | 12 Monate | RT | |
| 4003984 | TRAMAL Tropfen 100 mg/ml Dosierpumpe 96ml | RT | 12 Monate | RT | |
| 9122668 | TRESIBA Penfill Inj Lös 100 E/ml 5 x 3ml | KS | 4 Wochen | RT | nach Anbruch nicht mehr im Kühlschrank aufbewahren; Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9147590 | TRIOMER 3plus Nasmer Nasenspray 15 ml | RT | 3 Monate | RT | |
| 9028771 | TROPICAMIDE Gtt Opht 0.5 % 20 x 0.4 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen des Blisters Monodosen innerhalb von 4 Wochen verwenden |
| 9064731 | TROPIPHEN Augentropfen 10 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 4004013 | TRUSOPT Gtt Opht 2 % FI 5 ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 4001572 | ULTRACORTENOL AUGENSALBE 0,5% 5 | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9008148 | VAGOCLYSS Lös 120 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 4001733 | VALORON Tropfen 50 mg/0.5ml 20 ml | RT | 6 Monate | RT | enthält 19% Vol Alkohol |
| 9029341 | VALVERDE Verstopfung Sirup 200 ml | RT | 2 Monate | RT | enthält 4% Vol Alkohol |
| 9029383 | VENTOLIN Inhal Lös 0.05 % 60 Monodosis 2.5 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen der äusseren Aluminiumfolie innerhalb von 3 Monaten verwenden; Lichtschutz einhalten |
| 9028769 | VENTOLIN Lös 0.5 % f Aerosolgeräte 20 ml | RT | 4 Wochen | RT | Rückstände im Vernebler verwerfen |
| 9094880 | VICTOZA Inj Lös 6 mg/ml 2 Fertipen 3 ml | KS | 4 Wochen | RT/KS | Lichtschutz einhalten; nicht einfrieren |
| 9085980 | VIGAMOX Gtt Opht FI 5 ml | RT | 28 Tage | RT | |
| 9108025 | VIMPAT Sirup 10 mg/ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9134734 | VIRAMUNE Susp 50 mg/5ml FI 240 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9136808 | VITAMIN D3 Streuli 4000 E/ml 10 ml | RT | 3 Monate | RT | |
| 4004087 | VOLTAREN OPHTHA SDU Gtt Opht 20 x 0.3 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen des Beutels Monodosen innerhalb von 4 Wochen verwenden |
| 9135232 | WASSERSTOFFPEROXID-LÖS 3 % Bichsel 250ml | RT | 4 Wochen | RT | |
| 9121322 | WELEDA BABY Calendula Babyöl | RT | 6 Monate | RT | |
| 9012944 | WELLVONE Susp 750 mg/5ml 210 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9024533 | XALATAN Gtt Opht 2.5 ml | RT | 4 Wochen | RT | Ausfällung mit thiomersalhaltigen Augentropfen, im Abstand von 5 Minuten applizieren |
| 4001772 | XYLOCAIN, PUMPSPRAY 50 ML 10% | RT | 6 Monate | RT | |

Haltbarkeit nach Anbruch

| SAP-Nr | Materialkurztext | Lagertemp. | Haltbarkeit geöffnet | Lagertemp. geöffnet | Bemerkungen |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------|--|
| 9058973 | XYZAL Tropfen FI 20 ml | RT | 6 Monate | RT | |
| 9059021 | ZADITEN OPHTHA SDU Gtt Opht 20 x 0.4 ml | RT | Einmalgebrauch | / | nach Öffnen des Beutels Monodosen innerhalb von 3 Monaten verwenden; Lichtschutz einhalten |
| 9027127 | ZINAT Susp 125 mg/5ml 70 ml | RT | 10 Tage | KS | Lichtschutz einhalten; kann bei Bedarf kurz vor der Einnahme einem kalten Getränk wie Fruchtsaft oder Milch beigemischt werden |
| 9029639 | ZOFRAN Sirup 4 mg/5ml 50 ml | RT | 6 Monate | RT | nicht im KS lagern |
| 4002857 | ZOVIRAX Augensalbe Tb 4.5 g | RT | 4 Wochen | RT | |