

Datum:	05.03.18
Seite:	1 von 5
Gültig ab:	08.05.2017
Autorisierte Kopie Nr.:	02 Bo 15.05.2017
Dokumentenummer:	LL0019-V07.doc

Liste

Liste: Zermörserbarkeit und Verabreichungshinweise von Tabletten

Prüfung und Genehmigung

Funktion:	Name:	Datum:	Unterschrift:
Autor	D. Bornand		
Leiter Klinikbetreuung	Dr. H. Plagge		
Leiterin Klinische Pharmazie	D. Bornand		
Leiter Qualitätssicherung	Dr. S. Deuster		

Historie und Gültigkeitsdauer

Die vorliegende Liste ersetzt die Version LL0019-V06, gültig ab: 19.07.2010
Diese Liste ist gültig bis zur nächsten Revision, längstens jedoch bis 3 Jahre nach dem Gültigkeitsdatum gemäss Kopfzeile

Übergeordnete und Mitgeltende Dokumente

Dokumenten-Nr.:	Titel	Ausgabedatum
RL0023-V05	Listen	09/2012

Verteiler

- Autorisierte Kopien gemäss Verteilerliste

Beilagen

- Zermörserbarkeit und Verabreichung von Tabletten Dokumenten-Nr.: LL0019-V07-B01

Die Angaben dieser Liste wurden nach bestem Wissen zusammengetragen, es kann jedoch keine Garantie über die Richtigkeit der Angaben übernommen werden.

Copyright Spital-Pharmazie 2013

Diese Liste darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Autors nicht kopiert und in andere Websites oder Medien übernommen werden.

Datum:	05.03.18
Seite:	2 von 5
Gültig ab:	Siehe Deckblatt
Autorisierte Kopie Nr.:	Siehe Deckblatt
Dateiname:	LL0019-V07.doc

Liste

Zermörserbarkeit und Verabreichungshinweise von Tabletten

Allgemein gilt

- Bei der Verabreichung von Arzneimitteln über Sonden besteht die Gefahr, dass die Ernährungssonde verstopfen kann, Arzneimittel unwirksam werden oder reizend auf die Schleimhaut wirken. Die Verstopfungsgefahr erhöht sich mit wachsender Sondenlänge und kleiner werdendem Durchmesser, so dass PEG Sonden weniger oft verstopfen als nasogastrale Sonden.
- Bei gastraler Sondenlage kann die durch gelöste oder suspendierte Arzneimittel erhöhte Osmolarität (max. 1000 mOsm/l) ausgeglichen werden. Liegt die Sonde jedoch jejunal/duodenal, sollen zur Vermeidung von Krämpfen und Diarrhöe möglichst isotonische Lösungen (ca. 300 mOsm/l) verabreicht werden.
- Arzneimittel dürfen nicht zusammen mit der Sondennahrung, sondern müssen separat aufgrund der komplexen Zusammensetzung der Sondennahrung als Bolus mit vorherigem und anschliessendem Spülen der Sonde mit je 15-30 ml Wasser verabreicht werden (Kinder 5–10ml). Ansonsten besteht die Gefahr einer Ausfällung der Ernährungslösung, der Verstopfung der Sonde durch Inkompatibilitäten oder der Verminderung der Arzneimittelwirkung durch schlechte Bioverfügbarkeit. Hinweise dazu liefert die folgende Liste in der Spalte «Einnahme mit Nahrung». Die Angaben stammen aus dem Arzneimittel-Kompendium und gelten ebenfalls bei der Gabe nicht zermörserter Tabletten und Dragées.
- Mehrere Arzneimittel sollten nicht gemischt werden, da es hierbei aufgrund von chemischen Reaktionen zu Interaktionen kommen kann. Zwischen den einzelnen Applikationen soll die Sonde mit 10–20 ml Wasser gespült werden.
- Die Angaben zum Aussendurchmesser der Sonden werden in Charrière (CH) angegeben (1 CH=0.33 mm), der Innendurchmesser ist ca. 2-3 CH geringer. Polyurethan Sonden weisen im Vergleich zu Silikon-Kautschuk Sonden dünnere Wandstärken auf. Nurisoft M (Nutricia) CH 10, Compat Soft M (Nestle) CH 16, Entlastungssonde Levin CH 16, Freka PEG CH 15, Gastrotube Kangaroo (Covidien) CH 16; Jejunalkatheter (Fresenius) CH 8, PEG mit intestinaler Verlängerung CH 8, Trelumina intestinaler Schenkel CH 9.
- Bei der Arzneimittelgabe durch die Sonde sollen möglichst flüssige Darreichungsformen gewählt werden, die zur Sondengabe weiter verdünnt werden.
- Tabletten werden nur beim Fehlen einer alternativen Darreichungsform verabreicht. In diesem Fall werden sie zu feinem Pulver zermörsert und dann in Wasser suspendiert. Das Ausweichen auf eine rektale oder parenterale Form sollte als Alternative immer ins Auge gefasst werden. Die Angaben zur Teilbarkeit beziehen sich auf eine vorhandene Bruchrille und auf alle zugelassenen Stärken, ausser es wird explizit auf Ausnahmen hingewiesen. **Die Spalte Dosishalbung zeigt zudem auf, wenn eine Bruchrille nur zur Zierde vorhanden ist, die Halbierung der Tablette jedoch nicht die Hälfte der Wirkstoffmenge ergibt. Die Tabletten mit einem Nein in dieser Spalte dürfen zur Vereinfachung der Schluckbarkeit geteilt werden, doch muss immer die ganze Tablette verabreicht werden.**
- Zur Verdünnung der Arzneimittel wird stilles Mineralwasser verwendet. Andere Flüssigkeiten wie Orangensaft oder Tee sind zu vermeiden, da die verschiedenen Tees ein hygienisches Problem darstellen und Fruchtsäfte Interaktionen mit den Arzneimitteln und den Ernährungslösungen hervorrufen können.
- Bei jejunaler/duodenaler Sondenlage sollten keine Arzneimittel verabreicht werden. Nur in Ausnahmefällen und nach der Prüfung einer jejunalen Wirkung

Datum:	05.03.18
Seite:	3 von 5
Gültig ab:	Siehe Deckblatt
Autorisierte Kopie Nr.:	Siehe Deckblatt
Dateiname:	LL0019-V07.doc


Liste

Zermörserbarkeit und Verabreichungshinweise von Tabletten

darf bei einer isotonischen Verdünnung ein Bolus von maximal 50 ml verabreicht werden.

- Empfehlungen bei verstopften Sonden: Kohlensäurehaltigen Getränk (Cola, Mineralwasser) oder auf ärztliche Verordnung Pankreasenzyme in Natriumbicarbonat 8.4% in die Sonde einbringen und einwirken lassen oder versuchen, mit einer Spritze (10 ml) unter Druck spülen (cave: Gefahr der Sondenruptur!). Die Sonde darf nie mechanisch frei gemacht werden. Bei Problemen kann die Gastroenterologie beigezogen werden.
- **Die in dieser Liste vorgeschlagenen Alternativ-Präparate dürfen erst nach ärztlicher Verordnung eingesetzt werden.**

Die Spalten «**Zwingend nüchtern**», «**Zwingend mit Nahrung**» und «**Unabhängig von Mahlzeit**» beziehen sich nicht nur auf die Einnahme per Sonde sondern sind allgemein gültig. Eine nüchterne Einnahme bedeutet eine Nahrungskarenz von mindestens 1 Stunde nach der Arzneimittelgabe und mindestens 2 Stunden nach Nahrungsmittelverabreichung. (X) gibt an, dass eine Gabe in der angegebenen Form wenn immer möglich bevorzugt werden soll.



Grundregeln zur Verabreichung von Arzneimitteln über Sonden

- Ist die orale Gabe noch möglich und erlaubt?
- Wo liegt das Sondenende? Im Magen herrscht einen pH-Wert von 1-2, im Duodenum / Jejunum pH 8-9, was eine Auswirkung hat auf die Aufnahme von Arzneimitteln. Die jejunale / duodenale Verabreichung meiden.
- Beschränkung der Anzahl Arzneimittel auf die absolut notwendigen durch den Arzt
- Geeignetste Form jedes Arzneimittels suchen:
 - orale Lösung / Tropfen oder Brausetabletten
 - Zäpfchen
 - Transdermale Pflaster
 - sublinguale Darreichungsform
 - Tabletten / Dragées
 - Ampullen (parenterale oder teilweise auch enterale Gabe)
- Flüssige Arzneiformen sind bei der Sondengabe zu bevorzugen
- Tabletten sind wenn möglich unmittelbar vor der Verabreichung zuzubereiten und einzeln zu verabreichen
- Hygienische Standards beachten

Datum:	05.03.18
Seite:	4 von 5
Gültig ab:	Siehe Deckblatt
Autorisierte Kopie Nr.:	Siehe Deckblatt
Dateiname:	LL0019-V07.doc

Liste**Zermörserbarkeit und Verabreichungshinweise von Tabletten****Verabreichungsgrundlagen bei verschiedenen Arzneiformen****Sirupe/ Lösungen:**

Der Zucker- und Alkoholgehalt kann durch Erhöhung der Osmolarität Diarrhöen auslösen und zu gastrointestinalen Beschwerden führen, da der normale Verdünnungsvorgang ausbleibt. Vor der Verabreichung müssen orale Lösungen mit mindestens dem doppelten Volumen an Wasser verdünnt werden, das heisst mit ca. 30-60 ml Wasser auf eine Osmolarität von 300 mosmol/l (z.B.: Primperan, Ulcogant, Alucol, Antibiotika-Sirupe). Auf Intensivstationen ist nur behandeltes Wasser (abgekochtes, steriles oder CO₂-haltiges Wasser) zur Verdünnung zu verwenden, aufgrund der Pseudomonaden kein unbehandeltes Trinkwasser. Ein tiefer pH-Wert der Lösung kann zusätzlich zu lokalen Reizungen führen, oder im direkten Kontakt mit Ernährungslösung die Proteine ausfällen.

Ampullen:

Die parenterale Form von Arzneimitteln ist nicht immer geeignet für die orale Gabe, da sie oft aus Stabilitätsgründen ein anderes Salz des Wirkstoffs enthalten, was die Resorbierbarkeit verändert (z.B. Fortecortin Amp). Zusätzlich ist der Preis der parenteralen Form oft erheblich teurer als derjenige der oralen Form.

Brausetabletten / Granulate:

Brausetabletten in 60-90 ml Wasser auflösen und falls nötig weiter verdünnen, da die Hilfsstoffe häufig schleimhautreizend sind. Beim Auflösen von Tabletten bleiben oft unlösliche Teile übrig; es sind Hilfsstoffe, welche nicht verabreicht werden müssen. Der Durchmesser von sich nicht lösenden Granulaten muss bei dünnen Sonden beachtet werden, um verstopfte Sonden zu vermeiden.

Filmtabletten / Dragées:

Viele einfache Tabletten wie Lasix und Glucophage können ohne negative Folgen fein zermörsert und in 10-15 ml Wasser aufgeschwemmt werden. Das direkte Auflösen in einer Spritze ist wegen dem verminderten Substanzverlust von Vorteil, aber nicht immer machbar. Filmüberzüge haben in der Regel keinen Einfluss auf das Freisetzungverhalten, sondern dienen dem Schutz vor Feuchtigkeit, Licht, Luft und zum Schutz des Anwenders. Doch können diese Filmrückstände störend wirken, da sie rasch aufquellen oder sich schlecht fein zermörsern lassen.

Kapseln:

Die Kapselhülle von unretardierten Hartgelatine kapseln dient als Schutz zum Beispiel vor irritierenden Wirkstoffen oder schlechtem Geschmack und kann geöffnet werden. Der Inhalt der Kapsel (Pellets, Pulver) wird in Wasser suspendiert oder gelöst, aber nicht zermörsert. Bei dünnen Sonden muss der Durchmesser der Pellets geprüft werden. Oft verkleben die Pellets jedoch bereits die Spritze, so dass diese nur mit grossem Aufwand per Sonde verabreicht werden können.

Sublinguale Tabletten:

Sublinguale Tabletten (z.B. Nitroglycerin, Temgesic) dürfen meist nicht zerkleinert werden, da der Resorptionsort unter der Zunge liegt und die Gefahr einer Unterdosierung oder ausbleibenden Wirkung besteht, falls die Tablette in den Magen gelangt.

Retardformen:

Diese dürfen nicht zermörsert werden, da dadurch das Retardprinzip verloren geht (z.B. Dilzem RR, Diamox Sustets, Madopar DR) und es zu Überdosierungen

Datum:	05.03.18
Seite:	5 von 5
Gültig ab:	Siehe Deckblatt
Autorisierte Kopie Nr.:	Siehe Deckblatt
Dateiname:	LL0019-V07.doc

Zermörserbarkeit und Verabreichungshinweise von Tabletten

Liste

und einer verkürzten Wirkdauer kommt. Die Retardformulierungen können mit den schnellfreisetenden Tablettenformen ersetzt werden, doch müssen das Dosierungsintervall und die Dosis angepasst werden.

Magensaftresistente Formen:

Diese Formen dürfen nur bei einer jejunalen/duodenalen Applikation zermörsert oder geöffnet (Kapsel) werden, da sonst die Wirkstoffe im Magen instabil sind und zerstört werden oder die Magenschleimhaut reizen (z.B. Prontolax, Orfiril). Fehlende Wirkung kann die Folge sein.

Magensaftresistente Granulate oder Pellets einer Kapsel dürfen als solche durch eine Sonde mit grossem Lumen appliziert, jedoch nicht zermörsert werden

Weichgelatinekapselformen:

Diese können zwar in lauwarmem Wasser aufgelöst werden, doch besteht die Gefahr einer Unterdosierung (z.B. Ephynal Kaps). Alternativ kann der Inhalt mit einer Spritze und Kanüle aufgezogen werden. Doch ist die Applikation von Weichgelatinekapselformen per Sonde nicht geeignet und sollte nur im Notfall durchgeführt werden.

Abkürzungen:

Btl	Beutel	Min.	Minuten
Brausetabl	Brausetablette	mind.	Mindestens
BV	Bioverfügbarkeit	NEIN	Nicht teilbar, hat keine Bruchrille oder nur zur für vereinfachtes Schlucken
CH	Charrière (1 CH = 0.33 mm)	Piv	Pulver
Drag	Dragée	po	per oral
Fl	Flüssigkeit	S	Suspendieren
Gran	Granulat	SPh	Spital-Pharmazie
h	Stunden	Supp	Suppositorium
HS	Hilfsstoff	Susp	Suspension
Inj	Injektion	Tabl	Tablette
indiv.	Die Dosierung erfolgt individuell	Tr	Tropfen
Inf	Infusion	UAW	Unerwünschte Arzneimittelwirkung
iv.	Intravenös	uM.	Unabhängig von den Mahlzeiten
IA	Interaktion	WS	Wirkstoff
JA	Teilbar, Tablette hat Bruchrille	Z	Zermörserbar
kA	Keine Angaben	Ø	Durchmesser
Lös	Lösung		
L	Lösen		

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
3TC GLAXO Filmtabl 300 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, sofort verabreichen. Im Notfall vor Hautkontakt schützen und nicht von Frauen im gebärfähigen Alter zermörsern lassen.	3TC Lös 150mg/15ml (ohne Alkohol)
ABILIFY Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	ABILIFY Schmelztabl, Sirup 1 mg/ml, Injektionslösung 7.5 mg/ml (alles nicht Lager)
ABILIFY Tabl 15 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	ABILIFY Schmelztabl, Sirup 1 mg/ml, Injektionslösung 7.5 mg/ml (alles nicht Lager)
ABILIFY Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	ABILIFY Schmelztabl, Sirup 1 mg/ml, Injektionslösung 7.5 mg/ml (alles nicht Lager)
ACIDUM FOLICUM Hänseler Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
ACIMETHIN Filmtabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
ACTONEL Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Mit ca. 2dl Flüssigkeit suspendieren. Nicht ohne Sonde zermörsert verabreichen, da Schleimhaut reizend.	-
ADALAT CR Ret Tabl 30 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	GITS-Tabl (gastro-intestinales System), Retardprinzip geht verloren	ADALAT pro inf (enthält Ethanol, nur parenterale Gabe), NITRODERM TTS
ADALAT CR Ret Tabl 60 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	GITS-Tabl (gastro-intestinales System), Retardprinzip geht verloren	ADALAT pro inf (enthält Ethanol, nur parenterale Gabe), NITRODERM TTS
ADALAT RETARD Tabl 20 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	WS lichtempfindlich, nicht im direkten Sonnenlicht arbeiten und sofort verabreichen. Retardprinzip geht verloren, dadurch massive Blutdruckabfälle und Rebound Tachykardie möglich	ADALAT pro inf (enthält Ethanol, nur parenterale Gabe), NITRODERM TTS

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
AKINETON 2 Tabl 2 mg	JA	JA	Z / S		X		Die nüchterne Einnahme kann zu Magenschmerzen führen	AKINETON iv. (nur parenterale Gabe)
AKINETON RETARD Tabl	JA	NEIN	Keine		X		Matrixtabl. Die nüchterne Einnahme kann zu Magenschmerzen führen	AKINETON iv. (nur parenterale Gabe)
ALDACTONE Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	SOLDACTONE Amp 200mg/2ml
ALDACTONE Filmtabl 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	SOLDACTONE Amp 200mg/2ml
ALDACTONE Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	SOLDACTONE Amp 200mg/2ml
ALENDRONAT Spirig Wochentabletten 70 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			Mit Vorteil Alternativen benutzen, WS ist reizend für die Schleimhaut! Zermörserung nur bei Sondengabe möglich, nur mit Leitungswasser suspendieren. Nach der Gabe mind. 30 Minuten warten bis zum Wiederbeginn der Sondennahrung.	BONVIVA iv. , ACLASTA iv. (nur parenterale Gabe)
ALKERAN Filmtabl 2 mg	NEIN	NEIN	Keine	X			Cave: Zytostatikum! Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen zermörsert werden.	ALKERAN iv. (nur parenterale Gabe)
AMARYL Tabl 2 mg	JA	JA	Z / S		X		-	Andere Sulfonylharnstoffe (Dosis!) oder auf Insulin-Gabe ausweichen
AMLODIPIN Sandoz eco Tabl 10 mg	JA	JA	T / S			X	Tabl zerfallen in 20 ml Wasser innerhalb 1 Min, Sonde ≥ 6.5CH, gut schütteln. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	-
AMLODIPIN Sandoz eco Tabl 5 mg	JA	JA	S			X	Tabl zerfallen in 20 ml Wasser innerhalb 1 Min, Sonde ≥ 6.5CH, gut schütteln. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	-
AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 1000 mg	JA	NEIN	Z / S oder S			X	Tabl zerfallen in 10 ml Wasser oder Saft, Z gibt feinere Suspension	AMOXICILLIN SANDOZ Susp 200 mg/4 ml
AMOXICILLIN Sandoz Disp Tabl 750 mg	JA	NEIN	Z / S oder S			X	Tabl zerfallen in 10 ml Wasser oder Saft, Z gibt feinere Suspension	AMOXICILLIN SANDOZ Susp 200 mg/4 ml

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
AMPHO MORONAL Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	Suspension oder Kautabl sind zu bevorzugen	AMPHO MORONAL Susp, Kautabl
ANAFRANIL Drag 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen	ANAFRANIL iv. (nur parenterale Gabe)
ANAFRANIL Drag 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen	ANAFRANIL iv. (nur parenterale Gabe)
ANAFRANIL SR 75 Divitabs 75 mg	JA	JA	Keine			X	Retardprinzip geht verloren	ANAFRANIL Drag oder iv.
ANDROCUR Tabl 50 mg	JA	JA	(Z / S)			X	Hormonartige Substanz: Nicht von Frauen im gebärfähigen Alter zermörsern lassen.	-
ANTABUS Dispergetten 400 mg	JA	JA	L			X	Tablette in einem halben Glas Wasser oder Fruchtsaft vollständig lösen	-
ANTIDOTUM THALLII HEYL Kaps. 500 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Inhalt in warmen Wasser auflösen, WS kann Mund und Zähne blau färben	-
APHENYLBARBIT Streuli Tabl 15 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	PHENOBARBITAL 10% Amp (nur parenterale Gabe)
APHENYLBARBIT Streuli Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	-	PHENOBARBITAL 10% Amp (nur parenterale Gabe)
APRANAX Filmtabl 550 mg	JA	JA	(Z / S)			X	WS hydrolyseempfindlich, sofort verabreichen	BRUFEN Brausegran (in 50ml Wasser lösen)/ Ponstan Susp/ ALGIFOR JUNIOR Susp 100 mg/5 ml, VOLTAREN Dispersible
APROVEL 150 Filmtabl 150 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Bitterer Geschmack, WS praktisch unlöslich in Wasser, für Sonde CH≥8 geeignet	-
APROVEL 300 Filmtabl 300 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Bitterer Geschmack, WS praktisch unlöslich in Wasser, für Sonde CH≥8 geeignet	-
APTIVUS Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Die Lösung muss bei Bedarf aus Deutschland importiert werden	APTIVUS Oral Solution 100 mg/ml (nicht Lager)
ARAVA Filmtabl 20 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Pulver nicht inhalieren und direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum)	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
ARCOXIA Tabl 30 mg	NEIN	NEIN	L			X	Tabl zerfallen in 20 ml Wasser innerhalb 2 Min, Sonde ≥ 8 CH, gut schütteln.	BRUFEN Brausegran (in 50ml Wasser lösen)/ Ponstan Susp/ ALGIFOR JUNIOR Susp 100 mg/5 ml, VOLTAREN Dispersible
ARCOXIA Tabl 60 mg	NEIN	NEIN	L			X	Tabl zerfallen in 20 ml Wasser innerhalb 2 Min, Sonde ≥ 8 CH, gut schütteln.	BRUFEN Brausegran (in 50ml Wasser lösen)/ Ponstan Susp/ ALGIFOR JUNIOR Susp 100 mg/5 ml, VOLTAREN Dispersible
ARICEPT Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter, für Sonde CH ≥ 8 geeignet	ARICEPT EVESS Schmelztabl (nicht Lager)
ARICEPT Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter, für Sonde CH ≥ 8 geeignet	ARICEPT EVESS Schmelztabl (nicht Lager)
ARIMIDEX Tabl 1 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Hormonartige Substanz: Von Frauen im gebärfähigen Alter nur mit Schutzmassnahmen zermörsern lassen.	-
ARIPIPRAZOL-Mepha 5 mg Tabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	ARIPIPRAZOL Oro Schmelztabl
ARIPIPRAZOL-Mepha 10 mg Tabl	JA	JA	Z / S			X	-	ARIPIPRAZOL Oro Schmelztabl
ARIPIPRAZOL-Mepha 15 mg Tabl	JA	JA	Z / S			X	-	ARIPIPRAZOL Oro Schmelztabl
AROMASIN Drag 25 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Dragées sind sehr hart und WS ist schlecht wasserlöslich, ergibt eine Susp. Vor Hautkontakt schützen und nicht von Frauen im gebärfähigen Alter zermörsern lassen.	-
ARTHROTEC 50 Bitabs	NEIN	NEIN	Keine			X	-	VOLTAREN DISPERSIBLE Tabl (mit PPI)
ARTHROTEC 75 Bitabs	NEIN	NEIN	Keine			X	-	VOLTAREN DISPERSIBLE Tabl (mit PPI)
ASPIRIN CARDIO 100 Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Magensaftresistenz geht beim Zermörsern verloren, so dass die UAW im Magen zunehmen können. Nicht für jejunale Sondengabe	ASPEGIC Btl

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
ASPIRIN CARDIO 300 Tabl 300 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Magensaftresistenz geht beim Zermörsern verloren, so dass die UAW im Magen zunehmen können. Nicht für jejunale Sondengabe	ASPEGIC Btl
ATACAND PLUS Tabl 16/12.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
ATACAND PLUS Tabl 8/12.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
ATACAND Tabl 16 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
ATACAND Tabl 8 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
ATARAX Filmtabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	ATARAX Sirup 2 mg/ml (nicht Lager)
ATORVASTATIN Filmtabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Mit 10 ml Wasser suspendieren. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
ATORVASTATIN Filmtabl 20 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit 10 ml Wasser suspendieren. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
ATORVASTATIN Filmtabl 40 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit 10 ml Wasser suspendieren. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
ATRIPLA Filmtabl	NEIN	NEIN	Keine	X			Komplexe Galenik, Kinetik stark verändert	TRUVADA Filmtabl + STOCRIN Lös 30 mg/ml (nicht Lager)
AUGMENTIN Tabl 1 g	JA	NEIN	Z / S			X	Kurz vor der Verabreichung zubereiten	AUGMENTIN Duo Susp / Amp
AUGMENTIN Tabl 625 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Kurz vor der Verabreichung zubereiten	AUGMENTIN Trio Susp / Amp
AURORIX 150 mg Tabl 150 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
AVALOX Filmtabl 400 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tabl zerfallen in Wasser in max. 15 Min	-
AXURA Filmtabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	AXURA Tr (10mg=20ggt, nicht Lager)
AZILECT Tabl 1 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
AZITHROMYCIN Pfizer Filmtabl 250 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	AZITHROMYCIN Pfizer Susp / Sachet (nicht Lager)
BAYPRESS Tabl 20 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
BECOZYM Drag forte	NEIN	NEIN	Z / S			X	Starker Vit. B-Geruch, schlecht löslich	BEROCCA Brausetabl (zusätzlich mit Vit. C / Mg) NEURORUBIN Amp (nicht Lager)
BELOC ZOK 100 Ret Tabl 100 mg	JA	JA	T / S			X	Tabl teilen und in kaltem Wasser suspendieren, aber nicht zermörsern (Micropellets nicht zermörsern).	BELOC Inj Lös (nur parenterale Gabe)
BELOC ZOK 200 Ret Tabl 200 mg	JA	JA	T / S			X	Tabl teilen und in kaltem Wasser suspendieren, aber nicht zermörsern (Micropellets nicht zermörsern).	BELOC Inj Lös (nur parenterale Gabe)
BELOC ZOK 25 Ret Tabl 25 mg	JA	JA	T / S			X	Tabl teilen und in kaltem Wasser suspendieren, aber nicht zermörsern (Micropellets nicht zermörsern).	BELOC Inj Lös (nur parenterale Gabe)
BELOC ZOK 50 Ret Tabl 50 mg	JA	JA	T / S			X	Tabl teilen und in kaltem Wasser suspendieren, aber nicht zermörsern (Micropellets nicht zermörsern).	BELOC Inj Lös (nur parenterale Gabe)
BENADON Tabl 300 mg	JA	JA	Z / S			X	Ampullen mit 30ml Wasser verdünnen für Sondenapplikation	VITAMIN B6 Ratiopharm Amp
BENERVA Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Starker Vit. B-Geruch, schlecht löslich	BENERVA Inj Lös 100 mg Amp. (1:1 verd. mit Wasser per Sonde)
BENERVA Tabl 300 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Starker Vit. B-Geruch, schlecht löslich	BENERVA Inj Lös 100 mg Amp. (1:1 verd. mit Wasser per Sonde)
BENEXOL B 12 Tabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Starker Vit. B-Geruch, schlecht löslich	-
BETASERC 24 Tabl 24 mg	JA	JA	Z / S		(X)		-	BETASERC Tr 8 mg/ml (nicht Lager)
BETASERC 8 Tabl 8 mg	NEIN	NEIN	Z / S		(X)		-	BETASERC Tr 8 mg/ml (nicht Lager)
BETNESOL Tabl 0.5 mg	JA	JA	L			X	Bereits in 10ml Wasser auflösbar	DIPROPHOS Inj Lös (nur intramuskuläre Gabe)
BRILIQUE Filmtabl 90 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Sonde gut spülen, über Sonde ≥ CH8 verabreichen	PLAVIX Filmtabl
BRUFEN Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich. Die zerkleinerten Tabl können Irritationen im Rachenbereich hervorrufen	BRUFEN Brausegran (in 50ml Wasser lösen)/ Ponstan Susp

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
BRUFEN Filmtabl 400 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich. Die zerkleinerten Tabl können Irritationen im Rachenbereich hervorrufen	BRUFEN Brausegran (in 50ml Wasser lösen)/ Ponstan Susp
BRUFEN Filmtabl 600 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich. Die zerkleinerten Tabl können Irritationen im Rachenbereich hervorrufen	BRUFEN Brausegran (in 50ml Wasser lösen) / Ponstan Susp
BRUFEN RETARD Tabl 800 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich. Die zerkleinerten Tabl können Irritationen im Rachenbereich hervorrufen	BRUFEN Brausegran (in 50ml Wasser lösen)/ Ponstan Susp
BUDENOFALK Kaps 3 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern, sinken rasch ab. Mit Orangensaft, Cola oder Himbeersirup (leicht sauer) suspendieren (CH≥10)	-
BUSCOPAN Drag 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS sehr bitter.	BUSCOPAN Supp / Amp (nur parenterale Gabe)
CABASER Tabl 1 mg	JA	JA	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Bioverfügbarkeit vor, mit klinischer Überprüfung aber möglich	-
CABASER Tabl 2 mg	JA	JA	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Bioverfügbarkeit vor, mit klinischer Überprüfung aber möglich	-
CALCIMAGON D3 500/800 Kautabl zitron	NEIN	NEIN	L / S			X	-	CALCIUM Sandoz Brausetabl + Vitamin D3 Tr
CALCIUM PHOSPHATBIND Bichsel Tabl 1000 mg	JA	JA	Z / S		X		Vor/nach der Gabe Sonde gut spülen, da die Sonde bei der Gabe von Sondennahrung sonst verstopft. Nicht für jejunale Sondengabe.	-
CALCIUMACETAT SALMON Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	L			X	In wenig Wasser löslich. Nicht für jejunale Sondengabe. Kann Magenschmerzen verursachen.	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
CALCIUMGLYCEROPHOSPHAT Kaps 105 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Vor/nach der Gabe Sonde gut spülen, da die Sonde bei der Gabe von Sondennahrung sonst verstopft. Nicht für jejunale Sondengabe.	CALCIUMGLUCONAT Braun 10% Amp (nur für parenterale Gabe)
CAMPRAL Tabl	NEIN	NEIN	Keine			X	Magensaftresistenter Film	ANTABUS Dispergetten
CAPTOPRIL MEPHA Tabl 12.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tabl schlecht löslich, aber suspendierbar	-
CARDURA CR Filmtabl 4 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Galenische Form mit nicht absorbierbarer Hülle	-
CASODEX Tabl 50 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Von Frauen im gebärfähigen Alter nur mit Schutzmassnahmen zermörsern lassen (Hormon-Antagonist)!	parenterale Antiandrogene
CATAPRESAN Tabl 150 mcg	JA	JA	Z / S			X	Die Amp sind vor der Verabreichung mit mindestens 30ml zu verdünnen	CATAPRESAN Amp
CEDUR RETARD Filmtabl 400 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Das Retardprinzip geht verloren	-
CELEBREX Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Kapselinhalt sofort oral verabreichen oder nur halbfester Nahrung (Joghurt etc.) beifügen, Inhalt kann die Sonde verkleben, nur CH≥12 verabreichen	ARCOXIA Tabl, andere NSAR
CELEBREX Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Kapselinhalt sofort oral verabreichen oder nur halbfester Nahrung (Joghurt etc.) beifügen, Inhalt kann die Sonde verkleben, nur CH≥12 verabreichen	ARCOXIA Tabl, andere NSAR
CELLCEPT Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Kapselinhalt nicht inhalieren und direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum)	CELLCEPT Susp 200 mg/ml, Sonde mit CH≥9 verwenden
CELLCEPT Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum)	CELLCEPT Susp 200 mg/ml, Sonde mit CH≥9 verwenden
CESENTRI Filmtabl 150mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
CESENTRI Filmtabl 300 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Bioverfügbarkeit vor, mit klinischer Überprüfung aber möglich	-
CHININSULFAT 250 Hänseler Drag 250 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Gut zermörsern, da ansonsten ein Verkleben der Sonde möglich	-
CIPRALEX Filmtabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	Die oralen Tropfen dürfen nur mit Wasser, Orangensaft oder Apfelsaft gemischt werden.	CIPRALEX Tr 20 mg/ml oder Schmelztabl (nicht Lager)
CIPROXIN 250 Tabl 250 mg	JA	JA	Z / S			X	Alternative benutzen: ergibt sonst tiefe Blutspiegel. Susp vor Anwendung schütteln, ist nicht für Sondengabe geeignet, da dickflüssig.	CIPROXIN Amp, Susp 250 mg/5 ml
CIPROXIN 500 Lacktabl 500 mg	JA	JA	Z / S			X	Alternative benutzen: ergibt sonst tiefe Blutspiegel. Susp vor Anwendung schütteln, ist nicht für Sondengabe geeignet, da dickflüssig.	CIPROXIN Amp, Susp 250 mg/5 ml
CIPROXIN 750 Lacktabl 750 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Alternative benutzen: ergibt sonst tiefe Blutspiegel. Susp vor Anwendung schütteln, ist nicht für Sondengabe geeignet, da dickflüssig.	CIPROXIN Amp, Susp 250 mg/5 ml
CIRCADIN Ret Tabl 2 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	Melatonin Trinklösung 5 mg/ml
CLAMOXYL RC Tabl 750 mg	JA	NEIN	Z / L		X		In ca. 10 ml Wasser lösen	CLAMOXYL Amp
CLINDAMYCIN C Kaps 150 mg Ad	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen, bitterer und übler Geschmack. Nach der Anwendung gut spülen (Ösophagitis)	CLINDAMYCIN C Granulat (zur Herstellung einer Lösung, nicht Lager) / CLINDAMYCIN C PHOSPHAT Amp
CLINDAMYCIN C Kaps 300 mg Ad	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen, bitterer und übler Geschmack. Nach der Anwendung gut spülen (Ösophagitis)	CLINDAMYCIN C Granulat (zur Herstellung einer Lösung, nicht Lager) / CLINDAMYCIN C PHOSPHAT Amp
CLOPIXOL Filmdrag 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	CLOPIXOL Tr 20 mg/ml, Acutard Amp

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
CLOPIXOL Filmdrag 2 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	CLOPIXOL Tr 20 mg/ml, Acutard Amp
CLOPIXOL Filmdrag 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	CLOPIXOL Tr 20 mg/ml, Acutard Amp
CO DAFALGAN Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	CO DAFALGAN Bausetbl (nicht Lager)
CO DIOVAN Filmtabl 160/12.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl lösen sich langsam in Wasser auf	-
CO DIOVAN Filmtabl 160/25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl lösen sich langsam in Wasser auf	-
CO DIOVAN Filmtabl 80/12.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl lösen sich langsam in Wasser auf	-
CO RENITEN Tabl	JA	NEIN	Z / S			X	WS hydrolyseempfindlich, sofort verwenden	-
COAPROVEL 150/12.5mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Bitterer Geschmack	-
COAPROVEL 300/12.5 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Bitterer Geschmack	-
CODEIN Knoll Tabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	RESYL PLUS Tr, HYDROCODON Streuli Tabl
COFFEINUM N Tabl 0.2 g 50 Stk	JA	JA	Z / S			X	-	-
COLCHICINE Tabl 0.5 mg Dispert	JA	JA	Z / S			X	WS ist lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
COMBIVIR Tabl	JA	JA	Z / S			X	In 15 ml Wasser suspendieren und innerhalb von 10 Min verabreichen. Wirkstoff bitter	Monopräparate 3TC orale Lösung (150mg/15ml) und Retrovir Sirup 10 mg/ml
COMILORID MEPHA MITE Tabl 2.5/25	JA	JA	Z / S			X	Die Tabl zerfällt rasch in Wasser	-
COMILORID MEPHA Tabl 5/50	JA	JA	Z / S			X	Die Tabl zerfällt rasch in Wasser	-
COMTAN Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
CONCOR 10 PLUS Lacktabl 10/25mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
CONCOR 5 PLUS Lacktabl 5/12.5mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
CONCOR Lacktabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter, Lacktabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
CONCOR Lacktabl 2.5 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter, Lacktabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
CONCOR Lacktabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter, Lacktabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
CONDROSULF 800 Tabl 800 mg	JA	JA	Z / S			X	-	CONDROSULF Gran (nicht Lager)
CORDARONE Tabl 200 mg	JA	JA	Z / S			X	WS ist lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
CORVATON FORTE Tabl 4 mg	JA	JA	Z / S			X	WS ist lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
CORVATON RETARD Tabl 8 mg	JA	JA	Keine			X	Retardprinzip geht verloren (Matrixtabl): 2 x 1 Tabl Corvaton ret entspricht 4 x 1 Tabl Corvaton forte	CORVATON Tabl
COSAAR 100 Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter. Susp. aus zermörserten Tabl. nur per Sonde verabreichen.	-
COSAAR 12.5 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter. Susp. aus zermörserten Tabl. nur per Sonde verabreichen.	-
COSAAR PLUS 50/12.5 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter. Susp. aus zermörserten Tabl. nur per Sonde verabreichen.	-
COSAAR Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter. Susp. aus zermörserten Tabl. nur per Sonde verabreichen.	-
COVERSUM N Combi Filmtabl 5/1.25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
COVERSUM N Filmtabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
CREON 10000 Kaps	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S		X		Kapsel enthält Pellets für Sonde mit CH ₂ 16, Pellets nicht weiter zermörsern, nur in ausreichend Flüssigkeit (pH<4.5) suspendieren; die Sonde gut nachspülen. Für jejunale Sondengabe: 10'000 E Lipase (1 Kaps) in 10 ml Natriumbicarbonat 8.4% lösen.	Mit PEPTAMEN HN ernähren, Ernährungsberatung beiziehen
CREON 25000 Kaps	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S		X		Kapsel enthält Pellets für Sonde mit CH ₂ 16, Pellets nicht weiter zermörsern, nur in ausreichend Flüssigkeit (pH<4.5) suspendieren; die Sonde gut nachspülen. Für jejunale Sondengabe: 10'000 E Lipase (1 Kaps) in 10 ml Natriumbicarbonat 8.4% lösen.	Mit PEPTAMEN HN ernähren, Ernährungsberatung beiziehen
CRESTOR Filmtabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS ist lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
CRESTOR Filmtabl 20 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS ist lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
CRESTOR Filmtabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS ist lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
CYKLOKAPRON Tabl 500 mg	JA	JA	Z / S			X	-	CYKLOKAPRON Brausetbl
CYMBALTA Kaps 30 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets mit Magensaft resistentem Überzug, nur mischen mit sauren Lösungen (Apfelsaft, Cola). Die Granula klumpen in Wasser zusammen und können die Sonde verstopfen.	-
CYMBALTA Kaps 60 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets mit Magensaft resistentem Überzug, nur mischen mit sauren Lösungen (Apfelsaft, Cola). Die Granula klumpen in Wasser zusammen und können die Sonde verstopfen.	-
CYSTAGON Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S		X		Inhalt mit Nahrung oder Milch mischen, nicht mit sauren Getränken (Saft).	-
CYTOTEC 200 mcg Tabl	JA	JA	(Z / S)		X		WS in flüssiger Form bei RT instabil, da lichtempfindlich, nicht mit Sondenernährung mischen	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
DAFALGAN Brausetabl 500 mg	NEIN	NEIN	L			X	-	DAFALGAN Supp, Sirup, ODIS Schmelztabl
DAFALGAN Filmtabl 1 g	JA	NEIN	Z / S			X	-	DAFALGAN Brausetabl, Supp, Sirup, ODIS Schmelztabl
DAFALGAN ODIS Schmelztabl 500 mg	NEIN	NEIN	S			X	Schmilzt auf der Zunge oder mit Wasser	DAFALGAN Brausetabl, Supp, Sirup
DAFALGAN Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	DAFALGAN Brausetabl, Supp, Sirup, ODIS Schmelztabl
DAFLON 500 Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		-	Bei zwingender Indikation VENORUTON Pulv 1000 (nicht Lager)
DALMADORM MITE Spalttabl 15 mg	JA	NEIN	Z / S			X	WS bitter	DISTRANEURIN Mixtur, MIDAZOLAM Lös
DALMADORM Spalttabl 30 mg	JA	NEIN	Z / S			X	WS bitter	DISTRANEURIN Mixtur, MIDAZOLAM Lös
DANCOR Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	WS feuchtigkeitsempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen und beim Halbieren zweite Hälfte entsorgen.	-
DANTAMACRIN Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Kapselinhalt nicht weiter zerkleinern	-
DANTAMACRIN Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Kapselinhalt nicht weiter zerkleinern	-
DAONIL Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	Schnellere Resorption: Blutzuckerspiegel überwachen	Auf Insulin-Gabe ausweichen
DAPSON Fatol Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
DARAPRIM Tabl 25 mg	JA	JA	(Z / S)			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
DEANXIT Drag	NEIN	NEIN	Z / S			X	Resorption erhöht (evtl. Dosisanpassung)	-
DEPAKINE CHRONO 300 Filmtabl	JA	JA	Keine			X	Keine kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Sirup mit 1:3 mit Wasser verdünnen	ORFIRIL Sirup (Valproat-Spiegel messen)
DEPAKINE CHRONO 500 Filmtabl	JA	JA	Keine			X	Keine kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Sirup mit 1:3 mit Wasser verdünnen	ORFIRIL Sirup (Valproat-Spiegel messen)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
DEROXAT Filmtabl 20 mg	JA	JA	Z / S		X		Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich, nur CH≥12, WS bitter	DEROXAT Susp (nicht Lager)
DETRUSITOL SR Ret Kaps 2 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Kapsel enthält Pellets für Sonde mit CH≥10, Pellets nicht weiter zermörsern, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	SPASMO-URGENIN Neo Drg
DETRUSITOL SR Ret Kaps 4 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Kapsel enthält Pellets für Sonde mit CH≥10, Pellets nicht weiter zermörsern, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	SPASMO-URGENIN Neo Drg
DEXAMETHASON Galepharm Tabl 1 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter, Tabl in 5 ml Wasser suspendieren. Innerhalb 10 Min. verabreichen.	FORTECORTIN Tabl, Fertigspritzen (nur parenterale Gabe)
DEXAMETHASON Kapseln 40 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS bitter, innerhalb 10 Min. verabreichen.	FORTECORTIN Tabl, Fertigspritzen (nur parenterale Gabe)
DIACOMIT Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Nicht mit Milch oder Milchprodukten, kohlen säurehaltigen Getränken, Fruchtsäften und Koffein- oder Theophyllin-haltigen Nahrungsmitteln oder Getränken einnehmen	DIACOMIT Pulver (nicht Lager, NZA) in Wasser suspendiert. Suspension kann über Sonden appliziert werden. Ausreichend Nachspülen. Nicht getestet ist die Gabe von Diacomit Kapseln über die Sonden.
DIAMICRON MR Tabl 60 mg	JA	JA	Keine			X	Beim Zermörsern geht das Retardprinzip verloren. Alternative verwenden	Auf Insulin-Gabe ausweichen
DIAMOX Tabl 250 mg	JA	JA	(Z / S)			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Wirkstoff ist reizend für die Schleimhaut und kann Erbrechen hervorrufen, nur bei Sondengabe mörsern.	DIAMOX iv. (nur parenterale Gabe)
DIBENZYRAN 10 mg 50 Kaps	NEIN	NEIN	Keine		(X)		Wirkstoff nicht wasserlöslich, klebt an Sondenmaterial. Die Verträglichkeit steigt mit dem Essen.	-

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
DIFICLIR Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	In Wasser, Apfelsaft oder Ensure verdünnen und über eine Sonde >CH10 geben	-
DIFLUCAN Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	WS feuchtigkeitsempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Mit Vorteil Alternative verwenden.	DIFLUCAN Susp 10 mg/ml, 40 mg/ml (nicht Lager)
DIFLUCAN Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	WS feuchtigkeitsempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Mit Vorteil Alternative verwenden.	DIFLUCAN Susp 10 mg/ml, 40 mg/ml (nicht Lager)
DIFLUCAN Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	WS feuchtigkeitsempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Mit Vorteil Alternative verwenden.	DIFLUCAN Susp 10 mg/ml, 40 mg/ml (nicht Lager)
DIGOXIN Sandoz Tabl 0.125 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Schnellere Resorption möglich, Blutspiegel messen, mit Vorteil flüssige Form verwenden	LENOXIN Liquidum (aus Deutschland)
DIGOXIN Sandoz Tabl 0.25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Schnellere Resorption möglich, Blutspiegel messen, mit Vorteil flüssige Form verwenden	LENOXIN Liquidum (aus Deutschland)
DILATREND Tabl 12.5 mg	JA	JA	Z / S		(X)		WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TRANDATE Amp
DILATREND Tabl 25 mg	JA	JA	Z / S		(X)		WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TRANDATE Amp
DILATREND Tabl 6.25 mg	JA	JA	Z / S		(X)		WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TRANDATE Amp
DILZEM 120 RETARD Filmtabl 120 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Matrix-Retardtabl: Retardprinzip geht verloren. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	In der CH keine unretardierte Formulierung im Handel, welche zerkleinert werden kann
DILZEM 90 RETARD Filmtabl 90 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Matrix-Retardtabl: Retardprinzip geht verloren. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	In der CH keine unretardierte Formulierung im Handel, welche zerkleinert werden kann

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
DILZEM RR Filmtabl 180 mg	JA	NEIN	Keine			X	Matrix-Retardtabl: Retardprinzip geht verloren. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	In der CH keine unretardierte Formulierung im Handel, welche zerkleinert werden kann
DIMAVAL Kapseln 100 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S	X			Nicht mit anderen Elektrolyten geben (Ca/Mg etc.)	-
DIOVAN Filmtabl 160 mg	JA	JA	Z / S			X	Filmtabl lösen sich langsam in Wasser auf	-
DIOVAN Filmtabl 80 mg	JA	JA	Z / S			X	Filmtabl lösen sich langsam in Wasser auf	-
DIPIPERON Tabl	JA (Viertelbar)	JA (Viertelbar)	Z / S			X	-	HALDOL Tr 2mg/ml
DISTRANEURIN Kaps 300 MG	NEIN	NEIN	Keine			X	Inhalt der Weichgelatine Kapsel ist sehr sauer (für Sonde ungünstig)	DISTRANEURIN Mixtur
DITROPAN Tabl	JA	JA	Z / S			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen	KENTERA Pflaster
DOGMATIL 200 mg Tabl	A (Viertelbar)	JA	Z / S			X	Tabl zerfällt auch langsam in Wasser	-
DORMICUM Tabl 15 mg	JA	JA	Z / S			X	-	MIDAZOLAM Sirup, DORMICUM Amp (können iv / rektal verabreicht werden)
DORMICUM Tabl 7.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	MIDAZOLAM Sirup, DORMICUM Amp (können iv / rektal verabreicht werden)
DOSTINEX Tabl 0.5 mg	JA	JA	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Bioverfügbarkeit vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich. WS ist lichtempfindlich, innerhalb 10 Minuten verabreichen.	-
DOXIUM Kaps 500 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS wirkt reizend auf Schleimhaut	-
DULCOLAX BISACODYL Drag 5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Dragées mit Magensaft resistentem Überzug, nur duodenale / jejunale Sonden: Z / S	DULCOLAX BISACODYL Supp, LAXOBERON Tr

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
DUSPATALIN RETARD Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Retardkaps mit überzogenem Granulat, welche nicht zermörsert werden darf.	-
EBIXA Filmtabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	EBIXA Tr (nicht Lager)
EDRONAX Tabl 4 mg	JA	JA	Z / S			X	Susp in 15 ml Wasser, innerhalb von 10 Minuten verabreichen	-
EFAVIRENZ Mepha Lactab 600 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Wirkstoff in Wasser unlöslich, Verstopfungsgefahr gross. Die BV der Lös ist um 20% vermindert: 720 mg der Lös entspricht 1 Filmtabl. 600 mg	STOCRIN Lös 30 mg/ml (nicht Lager)
EFEEXOR ER 150 Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets (CH ₂ 14 notwendig) nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren.	VENLAFAXIN Tabl
EFEEXOR ER 37.5 mg Kaps 37.5 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets (CH ₂ 14 notwendig) nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren.	VENLAFAXIN Tabl
EFEEXOR ER 75 Kaps 75 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets (CH ₂ 14 notwendig) nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren.	VENLAFAXIN Tabl
EFIENT Filmtabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen, bitterer Geschmack	-
EFIENT Filmtabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen, bitterer Geschmack	-
ELEVIT PRONATAL Tabl	JA	JA	(Z / S)			X	Sehr schlecht löslich, nicht zur Sondenapplikation verwenden	SUPRADYN Brausetabl
ELIQUIS Filmtabl 2.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Niedermolekulare Heparine /Heparin therapeutisch sc./iv.
ELIQUIS Filmtabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Niedermolekulare Heparine /Heparin therapeutisch sc./iv.
ELTROXIN-LF Tabl 0.05 mg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)
ELTROXIN-LF Tabl 0.1 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
EMEND Kaps 80/125 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Arzneistoff liegt in der Kapsel geschützt in Nanopartikeln (Ø 1mm) vor, um Interaktionen mit der Nahrung zu verhindern, vorsichtig mischen	ZOFRAN Sirup / ZOFRAN ZYDIS Tabl, IVMEMEND Amp (nicht Lager)
EMEND SD Kapsel 165 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Arzneistoff liegt in der Kapsel geschützt in Nanopartikeln (Ø 1mm) vor, um Interaktionen mit der Nahrung zu verhindern, vorsichtig mischen	ZOFRAN Sirup / ZOFRAN ZYDIS Tabl, IVMEMEND Amp (nicht Lager)
EMSELEX Ret Tabl 7.5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Matrixtabl: Retardprinzip geht verloren. Tablette bildet Klumpen.	DETRUSITOL SR Kaps
EMTRIVA Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	In mind. 30ml Wasser suspendieren	EMTRIVA Lös 10 mg/ml (nicht Lager)
ENDOXAN Drag 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Cave: Zytostatikum! Die Ampullen dürfen auch oral verabreicht werden, verdünnt mit Orangensaft, Cola oder Himbeersirup (pH<5). Nach der Verdünnung Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit der Spital-Pharmazie auf.	ENDOXAN Fertigspritzen (Eigenherstellung) / ENDOXAN Lösung (Eigenherstellung) / Amp (im Notfall)
ENTOCORT CIR Ret Kaps 3 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets für Sonde mit CH≥8 notwendig, nicht weiter zermörsern, nur in Wasser oder Orangensaft suspendieren; geht schlecht.	ENTOCORT Enema, Glucocorticoide iv.
ENTRESTO Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Stabilität des WS unklar, keine Daten vorhanden.	ACE-Hemmer oder Sartan
ENTRESTO Tabl 50 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Stabilität des WS unklar, keine Daten vorhanden.	ACE-Hemmer oder Sartan
ENTUMIN Tabl 40 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
ERYTHROCIN ES 500 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S	X			-	ERYTHROCIN Granulat, Amp
ESIDREX 25 Tabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
ESOMEF MUPS Tabl 20 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl direkt in Spritze geben, mit 20-25 ml Wasser aufnehmen und zerfallen lassen (ca. 3 min), milchige Susp mehrfach schütteln bis eine gleichmäßige Susp vorliegt und sofort applizieren. Sonde mit CH≥9 notwendig. Duodenale / jejunale Sonden: Z / S	ESOMEF Amp (nur parenterale Gabe)
ESOMEF MUPS Tabl 40 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl direkt in Spritze geben, mit 20-25 ml Wasser aufnehmen und zerfallen lassen (ca. 3 min), milchige Susp mehrfach schütteln bis eine gleichmäßige Susp vorliegt und sofort applizieren. Sonde mit CH≥9 notwendig. Duodenale / jejunale Sonden: Z / S	ESOMEF Amp (nur parenterale Gabe)
EUTHYROX Tabl 100 mcg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)
EUTHYROX Tabl 125 mcg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)
EUTHYROX Tabl 150 mcg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)
EUTHYROX Tabl 25 mcg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)
EUTHYROX Tabl 50 mcg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)
EUTHYROX Tabl 75 mcg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	L-THYROXIN Inj 0.5 mg Amp (nur parenterale Gabe)
EVIPLERA Filmtabl	NEIN	NEIN	Keine		X		Veränderte Resorption möglich, schlechte Wasserlöslichkeit	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
EXELON Kaps 3 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	-	EXELON Lös (nicht Lager), TTS
EXELON Kaps 1.5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	-	EXELON Lös (nicht Lager), TTS
EXELON Kaps 4.5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	-	EXELON Lös (nicht Lager), TTS
FEMARA Tabl 2.5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Cave: Zytostatikum! Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen zermörsert werden.	-
FERRO SANOL Kaps	NEIN	NEIN	Keine	X			Pellets nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	VENOFER iv., FERINJECT iv. (nur parenterale Gabe) / MALTOFER Tr 50 mg Fe III/ml
FLAGYL Tabl 250 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Pulver nicht inhalieren und direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen	FLAGYL Trinklös 25 mg/ml
FLAGYL Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Pulver nicht inhalieren und direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen	FLAGYL Trinklös 25 mg/ml
FLATULEX Kautabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	FLATULEX Tr 41.2 mg/ml (Bananengeschmack)
FLORINEF Tabl 0.1 mg	JA	JA	Z / S			X	Tabl in 10 ml Wasser suspendieren, sofort verabreichen	-
FLOXAPEN Kaps 500 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S	X			-	FLOXAPEN iv. (nur parenterale Gabe)
FLOXYFRAL Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	-	Anderes SSRI (siehe AML N06A)
FLUANXOL Filmtabl 1 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	FLUANXOL iv. (nur parenterale Gabe) FLUANXOL Tr (nicht Lager, NZA)
FLUANXOL Filmtabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	FLUANXOL iv. (nur parenterale Gabe) FLUANXOL Tr (nicht Lager, NZA)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
FLUCTINE Tabl 20 mg	JA	JA	S			X	Tabl ist schnell löslich in 20 ml Wasser, WS bitter. Direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden	-
FLUDEX SR Tabl	NEIN	NEIN	Keine			X	Matrixtablette, Retardeffekt geht verloren	INDAPAMID Mepha Kaps (Kapselinhalt in Wasser sehr gut löslich)
FORTECORTIN Tabl 4 mg	JA	JA	Z / S			X	Tabl zerfallen spontan in Wasser, innert 10 min nach Zubereitung verabreichen (Lichtschutz), WS bitter. Nicht für jejunale Sondengabe (Resorption im Magen/oberen Dünndarm)	Glucocorticoide iv.
FUCIDIN Tabl 250 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS sehr bitter	FUCIDIN iv. (nur parenterale Gabe)
FURADANTIN Ret Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X (Verträglichkeit)	Gelbliche Kristalle, Retardeffekt durch kristalliner Struktur des WS. Nicht weiter zerkleinern und sofort verabreichen.	-
FYCOMPA Filmtabl 2 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Nur für Magensonden geeignet, kann in sauren Getränken gelöst werden.	-
FYCOMPA Filmtabl 6 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Nur für Magensonden geeignet, kann in sauren Getränken gelöst werden.	-
GASTROZEPIN Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S	X			WS hat schlechten Geschmack	Protonenpumpenblocker (ESOMEP MUPS Tabl)
GENVOYA Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S		X		-	-
GLIVEC Filmtabl 100 mg	JA	JA	S			X	Cave: Zytostatikum! Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen zermörsert werden. In 50 ml kohlendioxidfreiem Wasser oder Apfelsaft dispergieren und sofort verabreichen.	-
GLIVEC Filmtabl 400 mg	JA	JA	S			X	Cave: Zytostatikum! Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen zermörsert werden. In 200 ml kohlendioxidfreiem Wasser oder Apfelsaft dispergieren und sofort verabreichen	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
GLUCOBAY 50 Tabl 50 mg	JA	JA	Z / L		X		Tabletten gut wasserlöslich (ca. 10 Min.), können über die Sonde verabreicht werden.	Auf Insulin-Gabe ausweichen
GLUCOPHAGE 1000 Filmtabl 1000 mg	JA	JA	Z / S			X	WS hat metallischen, bitteren Geschmack.	Auf Insulin-Gabe ausweichen
GLUCOPHAGE 500 Filmtabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS hat metallischen, bitteren Geschmack.	Auf Insulin-Gabe ausweichen
GLUCOPHAGE 850 Filmtabl 850 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS hat metallischen, bitteren Geschmack.	Auf Insulin-Gabe ausweichen
GLUCOVANCE Filmtabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS hat metallischen, bitteren Geschmack	Auf Insulin-Gabe ausweichen
GLUCOVANCE MITE Filmtabl 250 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS hat metallischen, bitteren Geschmack	Auf Insulin-Gabe ausweichen
GLUTRIL Tabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	Auf Insulin-Gabe ausweichen
GUTRON Tabl 2.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	GUTRON Tr 10 mg/ml (nicht Lager)
GYNO TARDYFERON Depotdrag	NEIN	NEIN	Keine	X			Bei Tropfenersatz kann Folsäure zusätzlich gegeben werden (Acidum folicum Tabl 5 mg)	MALTOFER Tr 50 mg/ml, parenterales Eisen
HALCION Tabl 0.25 mg	JA	NEIN	(Z / S)			X	WS unlöslich in Wasser, fein zermösern	DORMEASAN Tr, NERVIFENE Liq, STILNOX Tabl
HALDOL Tabl 1 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Sonde kann durch Pulvermischung verkleben	HALDOL Tr
HALDOL Tabl 10 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Sonde kann durch Pulvermischung verkleben	HALDOL Tr
HUMATIN Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS feuchtigkeitsempfindlich, innerhalb von 10 Minuten verabreichen	HUMATIN Saft (NZA, nicht Lager)
HYDROCHLOROTHIAZID Kaps 1 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
HYDROCODON Streuli Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	WS löslich in Wasser	HYDROCODON Tropfen (nicht Lager)
HYDROCORTISON Galepharm Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S		X		Können in ca.10 ml Wasser suspendiert werden	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
HYDROCORTISON Kapseln 1 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	-
HYDROCORTONE Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S		X		Können in ca.10 ml Wasser suspendiert werden	-
HYTRIN BPH Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	TAMSULOSIN Ret Kaps
IMATINIB Teva Filmtabl 100 mg	JA	JA	S			X	Cave: Zytostatikum! Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen zermörsert werden. In 50 ml stillem Wasser oder Apfelsaft dispergieren und sofort verabreichen.	-
IMIGRAN 50 Filmtabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter	ZOMIG ORO Tabl (nicht Lager), IMIGRAN
IMODIUM Kaps 2 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Sonde kann durch Pulvermischung verkleben	IMODIUM lingual, Sirup (0.2mg/ml)
IMODIUM Lingual Tabl 2 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl zerfällt rasch	IMODIUM Sirup (0.2mg/ml)
IMOVANE Tabl 7.5 mg	JA	JA	Z / S			X	WS sehr bitter	DISTRANEURIN Mixtur
IMUREK Filmtabl 25 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Cave: Immunsuppressivum. Schutzmassnahmen einhalten wie Handschuhe, Mundschutz. Hautkontakt vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen. WS lichtempfindlich.	IMUREK Amp (nur parenterale Gabe)
IMUREK Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Cave: Immunsuppressivum. Schutzmassnahmen einhalten wie Handschuhe, Mundschutz. Hautkontakt vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen. WS lichtempfindlich.	IMUREK Amp (nur parenterale Gabe)
INDERAL Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
INDERAL Tabl 40 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
INDOMETACIN-RATIOPHARM Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	Anderes NSAR
INFECTOTRIMET 100 mg Tabl	JA	JA	Z / S			X	-	NOFIL Tabl
INFLOLAN Berna Kaps	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	-
INHIBACE MITE Tabl 2.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
INHIBACE PLUS Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
INHIBACE Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
INOVELON Filmtabl 200 mg	JA	JA	Z / S		(X)		-	INOVELON Susp 40 mg/ml
INOVELON Filmtabl 400 mg	JA	JA	Z / S		(X)		-	INOVELON Susp 40 mg/ml
INSPRA Filmtabl 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	ALDACTONE Filmtabl
INTELENCE Tabl 200 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl in 5 ml Wasser suspendieren und innerhalb 10 Minuten verabreichen, gut nachspülen.	-
INVEGA Ret Tabl 3 mg	NEIN	NEIN	Keine			X (Einnahme immer gleich)	Retardprinzip geht verloren	RISPERDAL Lös (1 mg/ml), XEPLION Inj Lös
INVEGA Ret Tabl 6 mg	NEIN	NEIN	Keine			X (Einnahme immer gleich)	Retardprinzip geht verloren	RISPERDAL Lös (1 mg/ml), XEPLION Inj Lös
INVIRASE Filmtabl 500 mg	NEIN	NEIN	Keine		X (innerhalb 2 h nach dem Essen)		Nicht empfohlen aufgrund schlechter Bioverfügbarkeit	-
ISENTRESS Filmtabl 400 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	WS bitter. Schnellere Freisetzung des WS durch das Zermörsern, da WS sonst in Granula verpackt ist. Ergibt höhere Spiegel. Die Kautabl sind nicht bioäquivalent.	ISENTRESS Kautabl (nicht Lager)
ISOKET RETARD 20 Tabl 20 mg	JA	NEIN	Keine			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Nur mit Wasser verdünnen.	ISOKET Retardkaps / Amp (nur parenterale Gabe)
ISOLEUCIN Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	-
ISONIAZID Labatec Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S	X			Mindestens 1h vor oder 2h nach dem Essen/Sondennahrung verabreichen	-
ISOPTIN 80 Filmtabs 80 mg	JA	JA	Z / S			X	WS ist instabil (sofort verabreichen), bitter und kann ein leicht betäubendes Gefühl auf der Mundschleimhaut hervorrufen	VERAPAMIL Amp 5mg/2ml
ISOPTIN Retardtabl Filmtabl 120 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	WS ist instabil (sofort verabreichen), bitter und kann ein leicht betäubendes Gefühl auf der Mundschleimhaut hervorrufen	ISOPTIN Filmtabl / VERAPAMIL Amp 5mg/ 2ml

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
ISOPTIN RR RETARD Filmtabl 240 mg	JA	JA	Keine			X	WS ist instabil (sofort verabreichen), bitter und kann ein leicht betäubendes Gefühl auf der Mundschleimhaut hervorrufen	ISOPTIN Filmtabl / VERAPAMIL Amp 5mg/2ml
JANUVIA Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Auf Insulin-Gabe ausweichen
JANUVIA Filmtabl 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Auf Insulin-Gabe ausweichen
JANUVIA Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Auf Insulin-Gabe ausweichen
JARDIANCE Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Auf Insulin-Gabe ausweichen
JARSIN 300 Drag 300 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, in lauwarmen Wasser besser löslich, bitterer Geschmack.	HYPERIFORCE Tr (nicht Lager)
JARSIN 450 Filmtabl 450 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, in lauwarmen Wasser besser löslich, bitterer Geschmack.	HYPERIFORCE Tr (nicht Lager)
KALETRA Filmtabl 200/50	NEIN	NEIN	Keine			X	Sirup unverdünnt geben, mit Milch nachspülen (nicht mit Wasser!), da es zu Ausfällungen kommen kann.	KALETRA Sirup
KCL RETARD Hausmann Drag	NEIN	NEIN	Keine			X	Matrix-Retardtabl (enthält 10mmol K+), die KCl Amp können auch 1:1 verdünnt oral gegeben werden	KCL 7.45% Amp (1mmol/ml K+, säuernd), KALIUM HAUSMANN Effervetten (30 mmol K+, alkalisierend)
KEPPRA Filmtabl 1000 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen: Sonde kann durch Pulvermischung verkleben. Überzug schützt vor dem leicht bitteren Geschmack	KEPPRA Lösung 100mg/ml (Traubengeschmack)
KEPPRA Filmtabl 500 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen: Sonde kann durch Pulvermischung verkleben. Überzug schützt vor dem leicht bitteren Geschmack	KEPPRA Lösung 100mg/ml (Traubengeschmack)
KEPPRA Tabl 250 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen: Sonde kann durch Pulvermischung verkleben. Überzug schützt vor dem leicht bitteren Geschmack	KEPPRA Lösung 100 mg/ml (Traubengeschmack)
KIVEXA Filmtabl	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen.	ZIAGEN Lös 20mg/ml (nicht Lager) + 3TC Lös 10mg/ml

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
KLACID 500 Filmtabs 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, Susp 1:1 mit Wasser verdünnen. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	KLACIPED Susp (125mg/5ml)
KLACID Filmtabl 250 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, Susp 1:1 mit Wasser verdünnen. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	KLACIPED Susp (125mg/5ml)
LAMICTAL Disp Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	S			X	Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10ml)	-
LAMICTAL Disp Tabl 25 mg	NEIN	NEIN	S			X	Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10ml)	-
LAMICTAL Disp Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	S			X	Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10ml)	-
LAMICTAL Disp Tabl 50 mg	NEIN	NEIN	S			X	Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10ml)	-
LAMISIL Tabl 250 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
LAMOTRIGIN Desitin Disp Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	S			X	Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10ml)	-
LAMOTRIGIN Desitin Tabl 100 mg	JA (Viertelbar)	JA	S			X	Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10ml)	-
LAMOTRIGIN Desitin Tabl 200 mg	JA	JA	S			X	Zubereitung direkt in Spritze, suspendierbar in wenig Wasser (5-10ml)	-
LANVIS Tabl 40 mg	NEIN	NEIN	Keine	X			Cave: Zytostatikum! Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen zermörsert werden.	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
LASILACTON 100 Filmtabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich, WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
LASILACTON 50 Filmtabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich, WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen.	-
LASIX LONG Kaps 30 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Retardeffekt bleibt erhalten, Pellets nicht zermörsern, Sonde mit CH ≥12 notwendig, WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Amp dürfen auch per Sonde verabreicht werden.	LASIX Amp oder Tabl
LASIX Tabl 40 mg	JA	JA	Z / S			X	Amp dürfen auch per Sonde verabreicht werden. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	LASIX Amp
LASIX Tabl 500 mg	JA (Viertelbar)	JA	Z / S			X	Amp dürfen auch per Sonde verabreicht werden. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen.	LASIX Amp
LEPONEX Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
LEPONEX Tabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
LESCOL RETARD Ret Tabl	NEIN	NEIN	Keine			X	Matrixtablette: Retardformulierung geht verloren	LESCOL Kaps
LEUCOVORINE CALC Farnos Tabl 15mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	LEUCOVORINE CALC Amp
LEUKERAN Manteltabl 2 mg	NEIN	NEIN	Keine	X			Cave: Zytostatikum! Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen zermörsert werden.	-
LEXOTANIL Tabl 1,5 mg	JA	JA	Z / S			X	Sehr fein pulverisieren für Sondenapplikation	DISTRANEURIN Mixtur
LEXOTANIL Tabl 3 mg	JA	JA	Z / S			X	Sehr fein pulverisieren für Sondenapplikation	DISTRANEURIN Mixtur
LEXOTANIL Tabl 6 mg	JA	JA	Z / S			X	Sehr fein pulverisieren für Sondenapplikation	DISTRANEURIN Mixtur
LIORESAL Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
LIORESAL Tabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
LIPANTHYL 200 M Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S		(X)		Pulver ist mikronisiert und braucht genügend Wasser, damit es nicht verklebt	-
LITALIR Kaps 500 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Cave: Zytostatikum! Die Kapseln dürfen nur unter Spezialbedingungen geöffnet werden.	-
LITHIOFOR Tabl 660 mg retard	JA	JA	Keine			X	Matrixtabl: Retardprinzip geht verloren. Unretardiertes Lithium hat andere Kinetik: TDM durchführen	QUILONORM Oblong Tabl
LIXIANA Filmtabl 30 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Niedermolekulare Heparine therapeutisch sc./iv.
LIXIANA Filmtabl 60 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Niedermolekulare Heparine therapeutisch sc./iv.
LOMIR SRO Kaps 5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Schlecht suspendierbar, Retardformulierung	Anderer Calcium-Antagonist (Dihydropyridin-Derivat) wie AMLODIPIN
LOPRESOR Retardtabl Divitabs 200 mg	JA	JA	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	BELOC ZOC Tabl
LYRICA Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / L			X	WS gut löslich, aber schlechter Geschmack	-
LYRICA Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / L			X	WS gut löslich, aber schlechter Geschmack	-
LYRICA Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / L			X	WS gut löslich, aber schlechter Geschmack	-
LYRICA Kaps 75 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / L			X	WS gut löslich, aber schlechter Geschmack	-
MADOPAR 125 Kaps 125 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S	X			WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	MADOPAR LIQ Tabl (schnellerer Wirkungseintritt)
MADOPAR 250 Tabl 250 mg	JA (viertelbar)	JA	Z / S	X			WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	MADOPAR LIQ Tabl (schnellerer Wirkungseintritt)
MADOPAR 62.5 Kaps 62.5 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S	X			WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	MADOPAR LIQ Tabl (schnellerer Wirkungseintritt)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
MADOPAR DR Tabl 200+50mg	JA	JA	Keine	X			Retard Form: Dual Release (schlecht löslich, Retard Matrix)	MADOPAR LIQ Tabl (schnellerer Wirkungseintritt)
MADOPAR LIQ Tabl 125 mg	JA	JA	T / L	X			Innerhalb 10 Minuten verabreichen. In 20ml Wasser lösen, nicht in Milch oder Fruchtsaft	-
MADOPAR LIQ Tabl 62.5 mg	JA	JA	T / L	X			Innerhalb 10 Minuten verabreichen. In 20ml Wasser lösen, nicht in Milch oder Fruchtsaft	-
MAGNESIOCARD 2.5 Tabl 2.5 mmol	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Bei oraler Mucositis ohne Sonde kann das Granulat brennen, da sind die Ampullen die bessere Alternative, welche mit 10-20 ml Wasser zu verdünnen sind.	MAGNESIOCARD Gran (5 oder 10 mmol Magnesium) / MAGNESIUM CHLORID Amp (5 mmol), MG5 SULFAT Amp 10% (4 mmol)
MALARONE Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		Mit Milch oder unter Essen mischen	-
MARCOUMAR Tabl 3 mg	JA	JA	(Z / S)			X	Der Patient ist schwer einstellbar und benötigt die normale, engmaschige Überwachung	Heparin / Niedermolekulare Heparine sc./iv./ XARELTO Tabl
MEDROL Tabl 32 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Trotz Bruchrille nicht geeignet zum Teilen. Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich	SOLUPRED Trinklösung (Dosisanpassung!)
MEDROL Tabl 4 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Trotz Bruchrille nicht geeignet zum Teilen. Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich	SOLUPRED Trinklösung (Dosisanpassung!)
MELNEURIN Tabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	Nicht in Kaffee, Tee und Milch einnehmen.	MELNEURIN Liq 5 mg/ml (NZA)
MEPHADOLOR NEO 500 mg Tabl	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen	PONSTAN Supp / PONSTAN Susp / BRUFEN Gran / VOLTAREN Supp
MEPHAQUIN Lactabs 250 mg	JA (Viertelbar)	JA	Z / S			X	Bitteren und leicht brennenden Geschmack	-
MESTINON Drag 60 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Hygroskopisch: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, Resorption verändert	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
MESTINON Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Hygroskopisch: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, Resorption verändert	-
METFORMIN Mepha Lactabs 1000 mg	JA	JA	(Z / S)			X	Verstärkte gastrointestinale Unverträglichkeit. WS hat metallischen, bitteren Geschmack.	Auf Insulin-Gabe ausweichen
METFORMIN Mepha Lactabs 500 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Verstärkte gastrointestinale Unverträglichkeit. WS hat metallischen, bitteren Geschmack.	Auf Insulin-Gabe ausweichen
METFORMIN Mepha Lactabs 850	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Verstärkte gastrointestinale Unverträglichkeit. WS hat metallischen, bitteren Geschmack.	Auf Insulin-Gabe ausweichen
METHADON Streuli Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	METHADON Tr 10 mg/ml
METHERGIN Drag 0.125 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen	METHERGIN Amp 0.2mg/ml (nur parenterale Gabe)
METHOTREXATE Farnos Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Keine	X (Dosis>15 mg)			Cave: Zytostatikum. Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen in Wasser gelöst werden. Nicht mit sauren Lösungen mischen.	METOJECT FSP, METHOTREXAT Amp
METHOTREXATE Farnos Tabl 2.5 mg	NEIN	NEIN	Keine	X (Dosis>15 mg)			Cave: Zytostatikum. Die Tabletten dürfen nur unter Spezialbedingungen in Wasser gelöst werden. Nicht mit sauren Lösungen mischen.	METOJECT FSP, METHOTREXAT Amp
METOLAZON Galepharm Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	Können in ca. 5 ml Wasser suspendiert werden. WS instabil, innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
MICARDIS PLUS Tabl 80/12.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Kurz vor der Verabreichung zubereiten	-
MICARDIS Tabl 40 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Kurz vor der Verabreichung zubereiten	-
MICARDIS Tabl 80 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Kurz vor der Verabreichung zubereiten	-
MINIRIN Tabl 0.1 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Bioverfügbarkeit tief, bevorzugt Alternative verwenden	MINIRIN Nasenspray, Nasentr, MINIRIN Melt (nicht Lager)
MOGADON Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	DISTRANEURIN Mixtur, MIDAZOLAM Lös

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
MOTILIUM Filmtabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Suspension vor Verwendung gut schütteln, pH abhängige Resorption: nur Brausegran. kann bei Jejunalsonde verwendet werden	MOTILIUM Susp 1mg/ml, lingual Tabl
MOTILIUM LINGUAL Schmelztabl 10 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl zerfällt rasch in Wasser	MOTILIUM Susp 1mg/ml / Supp
MST CONTINUS Ret Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Die Suspension aus Gran mit mind. 20 ml Wasser zubereiten und über Sonde≥CH9 verabreichen.	MST continus Susp ret. / SEVRE LONG ret Kaps / MORPHIN Tr 20 mg/ml
MST CONTINUS Ret Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Die Suspension aus Gran mit mind. 20 ml Wasser zubereiten und über Sonde≥CH9 verabreichen.	MST continus Susp ret. / SEVRE LONG ret Kaps / MORPHIN Tr 20 mg/ml
MST CONTINUS Ret Tabl 200 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Die Suspension aus Gran mit mind. 20 ml Wasser zubereiten und über Sonde≥CH9 verabreichen.	MST continus Susp ret. / SEVRE LONG ret Kaps / MORPHIN Tr 20 mg/ml
MST CONTINUS Ret Tabl 30 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Die Suspension aus Gran mit mind. 20 ml Wasser zubereiten und über Sonde≥CH9 verabreichen.	MST continus Susp ret. / SEVRE LONG ret Kaps / MORPHIN Tr 20 mg/ml
MULTAQ Filmtabl 400 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		-	-
MYAMBUTOL Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Der Wirkstoff ist in Wasser löslich	EMB Fatol iv. (nur
MYAMBUTOL Filmtabl 400 mg	JA	JA	Z / S			X	Der Wirkstoff ist in Wasser löslich	EMB Fatol iv. (nur
MYDOCALM Drag 150 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Der Wirkstoff ist in Wasser löslich	-
MYDOCALM MITE Drag 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Der Wirkstoff ist in Wasser löslich	-
MYFORTIC Filmtabl 180 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Filmtabl mit Magensaft resistentem Überzug, nur duodenale / jejunale Sonden: Z / S. Direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum)	CELLCEPT Susp
MYFORTIC Filmtabl 360 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Filmtabl mit Magensaft resistentem Überzug, nur duodenale / jejunale Sonden: Z / S. Direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum)	CELLCEPT Susp

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
MYSOLINE Tabl 250 mg	JA	JA	Z / S			X	WS schlecht wasserlöslich	PHENOBARBITAL 10% Amp
NACL Kaps 500 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Inhalt (8.5 mmol Natrium) in 10 ml Wasser lösen	Salzreiche Kost, Bouillon
NALTREXIN Filmtabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	Geschmack stark bitter, Zerkleinerung nur bei Sondengabe sinnvoll. In Aqua	-
NATULAN Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Cave: Zytostatika. Die Kapseln dürfen nur unter Spezialbedingungen geöffnet werden.	-
NEBILET Tabl 5 mg	JA (Viertelbar)	JA	Z / S			X	-	Alternativer Beta-Blocker
NEO MERCAZOLE Tabl 5 mg	JA	JA	S			X	Wirkstoff ist hautreizend, Tabl in Wasser zerfallen lassen	-
NEOTIGASON Kaps 10 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S		X		Kapselinhalt mit warmen Wasser oder Milch suspendieren. WS mutagen, nicht von Frauen im gebärfähigen Alter zubereiten lassen. Stark lichtempfindlich, sofort verabreichen	-
NEOTIGASON Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S		X		Kapselinhalt mit warmen Wasser oder Milch suspendieren. WS mutagen, nicht von Frauen im gebärfähigen Alter zubereiten lassen. Stark lichtempfindlich, sofort verabreichen	-
NEPHROTRANS Kaps	NEIN	NEIN	Keine			X	Kaps mit Magensaft resistentem Überzug, wird im Dünndarm resorbiert, Lösung kann auch oral verabreicht werden; 1:1 mit Wasser verdünnen	Natr. Bikarbonat 8.4% Bichsel 10ml (1mmol/ml)
NEURONTIN 100 Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
NEURONTIN 300 Kaps 300 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
NEURONTIN 400 Kaps 400 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
NEURONTIN Filmtabl 600 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
NEURONTIN Filmtabl 800 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
NEVIRAMPIN Mepha retard 400 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Suspension bevorzugen	VIRAMUNE Susp 50 mg/5 ml
NEXIUM MUPS 40 Tabl 40 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl direkt in Spritze geben, mit 20-25 ml Wasser aufnehmen und zerfallen lassen (ca. 3 min), milchige Susp mehrfach schütteln bis eine gleichmäßige Susp vorliegt und sofort applizieren. Sonde mit CH ≥ 8 notwendig. Duodenale / jejunale Sonden: Z / S	ESOMEPRAMPIN Amp (nur parenterale Gabe)
NIMOTOP Lacktabl 30 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	NIMOTOP Amp (nur parenterale Gabe)
NITROGLYCERIN Streuli Kaukaps 0.8 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Die Kapseln zerbeißen und den Kapselinhalt in der Mundhöhle wirken lassen.	NITRODERM TTS
NIVAQUINE Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter	-
NOLVADEX Tabl 20 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, Hautkontakt vermeiden, nicht von Frauen im gebärfähigen Alter zermörsern lassen	-
NOFIL FORTE Tabl	JA	JA	S			X	Tabl in 10 ml Wasser suspendieren	NOFIL Sirup
NORFLOXACIN Helvepharm 400 mg	JA	JA	Z / S	X			Nicht mit Milch, WS sehr bitter, licht- und hydrolyseempfindlich. Innerhalb von 10 Minuten verabreichen.	Andere Fluorchinolone, AUGMENTIN
NORVIR Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Keine		(X)		Mit Vorteil Alternative benutzen,	NORVIR Sirup (80mg/ml)
NOVALGIN Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS instabil: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	NOVALGIN Tr (500mg/ml)
NOVONORM Tabl 1 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		Engmaschige Kontrolle des Blutzuckerspiegels	Auf Insulin-Gabe ausweichen

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
NOVOTHYRAL Tabl	JA	JA	Z / S	X			WS hat bitteren Geschmack, ist feuchtigkeitsempfindlich. Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
NOXAFIL Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Tabl hat Magensaftreststenten Überzug, bei Verwendung der Lösung Dosis anpassen	NOXAFIL Amp 18 mg/ml, NOXAFIL Susp 40 mg/ml (nicht Lager)
NOZINAN Filmtabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	NOZINAN Tr (40mg/ml)
NOZINAN Filmtabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	NOZINAN Tr (40mg/ml)
ONDANSETRON Teva oro 4 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl zerfällt mit wenig Wasser	ZOFRAN Sirup (4 mg/5 ml (nicht Lager)
ONDANSETRON Teva oro 8 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl zerfällt mit wenig Wasser	ZOFRAN Sirup (4 mg/5 ml (nicht Lager)
ORFIRIL LONG 150 Ret Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Kapseln öffnen / S			X	Inhalt der Retardkaps quellen leicht, was die Sonden verkleben kann. Als Alternative Orfiril Sirup verwenden. Die Aufteilung der Tagesdosis auf 4 besser 5 Gaben ist empfehlenswert. Sirup mit Wasser 1:4 verdünnen.	ORFIRIL Sirup 300mg/5ml
ORFIRIL LONG 300 Ret Kaps 300 mg	NEIN	NEIN	Kapseln öffnen / S			X	Inhalt der Retardkaps quellen leicht, was die Sonden verkleben kann. Als Alternative Orfiril Sirup verwenden. Die Aufteilung der Tagesdosis auf 4 besser 5 Gaben ist empfehlenswert. Sirup mit Wasser 1:4 verdünnen.	ORFIRIL Sirup 300mg/5ml
ORFIRIL LONG Minipacks 1000 mg	NEIN	NEIN	Beutel öffnen / S			X	Inhalt der Minipacks quellen leicht, was die Sonden verkleben kann. Als Alternative Orfiril Sirup verwenden. Die Aufteilung der Tagesdosis auf 4 besser 5 Gaben ist empfehlenswert. Sirup mit Wasser 1:4 verdünnen.	ORFIRIL Sirup 300mg/5ml
ORFIRIL LONG Minipacks 500 mg	NEIN	NEIN	Beutel öffnen / S			X	Inhalt der Retardkaps quellen leicht, was die Sonden verkleben kann. Als Alternative Orfiril Sirup verwenden. Die Aufteilung der Tagesdosis auf 4 besser 5 Gaben ist empfehlenswert. Sirup mit Wasser 1:4 verdünnen.	ORFIRIL Sirup 300mg/5ml

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
OSPEN 1000 Tabl 1 Mio E	JA	JA	Z / S	X			WS bitter, Sonde mit CH≥8	OSPEN Sirup Mio UI/5 ml
OSPOLOT Filmtabl 200 mg	JA	JA	Z / S			X	Tabl zerfallen innert 1-2 Min, Susp geht durch Sonde mit CH≥14	-
OSPOLOT Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tabl zerfallen innert 1-2 Min, Susp geht durch Sonde mit CH≥14	-
OXYCONTIN Ret Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren, zusätzlicher Film um Tablette für verzögerte Freisetzung.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
OXYCONTIN Ret Tabl 20 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren, zusätzlicher Film um Tablette für verzögerte Freisetzung.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
OXYCONTIN Ret Tabl 40 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren, zusätzlicher Film um Tablette für verzögerte Freisetzung.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
PALEXIA Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter, Alternative bevorzugen	PALEXIA Lösung 20 mg/ml (nicht Lager)
PALEXIA Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter, Alternative bevorzugen	PALEXIA Lösung 20 mg/ml (nicht Lager)
PALEXIA Filmtabl ret 100 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	PALEXIA Lösung 20 mg/ml (nicht Lager)
PALEXIA Filmtabl ret 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	PALEXIA Lösung 20 mg/ml (nicht Lager)
PALLADON Kaps 1.3 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern, nur in 50 ml Sondennahrung oder Wasser suspendieren. Sonde mit CH≥16 notwendig.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
PALLADON Kaps 2.6 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern, nur in 50 ml Sondennahrung oder Wasser suspendieren. Sonde mit CH≥16 notwendig.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
PALLADON Ret Kaps 16 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern, nur in 50 ml Sondennahrung oder Wasser suspendieren. Sonde mit CH≥16 notwendig.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
PALLADON Ret Kaps 24 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern, nur in 50 ml Sondennahrung oder Wasser suspendieren. Sonde mit CH≥16 notwendig.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
PALLADON Ret Kaps 4 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern, nur in 50 ml Sondennahrung oder Wasser suspendieren. Sonde mit CH≥16 notwendig.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
PALLADON Ret Kaps 8 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern, nur in 50 ml Sondennahrung oder Wasser suspendieren. Sonde mit CH≥16 notwendig.	Umstellung auf anderes Opioid (DUROGESIC TTS, TRANSTEC TTS, OXYNORM Tr 10 mg/ml)
PANTOZOL Tabl 20 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Tabl mit Magensaft resistentem Überzug. In zwingenden Fällen kann Pantozol zermörsert und mit 60ml Natriumbicarbonat 1.4% suspendiert und über Magensonde verabreicht werden, danach mit Natriumbicarbonat 1.4% spülen. Für duodenale / jejunale Sonden: Z / S	ESOMEPI MUPS Tabl, PANTOZOL Gran (nicht Lager)
PANTOZOL Tabl 40 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Tabl mit Magensaft resistentem Überzug. In zwingenden Fällen kann Pantozol zermörsert und mit 60ml Natriumbicarbonat 1.4% suspendiert und über Magensonde verabreicht werden, danach mit Natriumbicarbonat 1.4% spülen. Für duodenale / jejunale Sonden: Z / S	ESOMEPI MUPS Tabl, PANTOZOL Gran (nicht Lager)
PARLODEL Tabl 2.5 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
PAROXETIN Mepha Filmtabl 20 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative verwenden, Tablette schlecht suspendierbar, kann Sonde verstopfen	DEROXAT Susp 20mg/10ml (nicht Lager)
PASPERTIN Filmtabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative verwenden.	PASPERTIN Tr 4 mg/ml

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
PERENTEROL Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	In 20 ml suspendieren	PERENTEROL Beutel (nicht Lager)
PETINIMID Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Keine				Weichkapseln	PETNIDAN Saft (NZA, nicht Lager)
PETINUTIN Kaps 300 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)				Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit	-
PHENHYDAN Tabl	JA	JA	(Z / S)			X	Blutspiegel sind unvorhersehbar, Gabe per Sonde nur Notlösung (Blutspiegelkontrolle).	PHENHYDAN Amp i.v.
PHENOBARBITAL Kaps 5 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	PHENOBARBITAL 10% Amp
PHOSPHAT SANDOZ Brausetabl 500 mg	NEIN	NEIN	L			X	Eine Brausetablette kann in ca. 50ml Wasser gelöst und verabreicht werden. Enthält 16.1 mmol Phosphat, 3.1mmol Kalium und 20.4mmol Natrium.	KALIUMPHOSPHAT Amp (K:10mmol, P:10mmol): sind ca. 1:10 mit Wasser zu verdünnen / NATRIUMPHOSPHAT Amp (P: 4.3 mmol, Na: 8.1 mmol): sind ca. 1:5 mit Wasser zu verdünnen
PHYSIOTENS MITE Tabl 0.2 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tabl zerfällt innert 5 Minuten in 10 ml Wasser.	-
PK MERZ Tabl	JA	NEIN	Z / S			X	-	PK MERZ Inf Lös (nur parenterale Gabe)
PLAQUENIL Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		-	-
PLAVIX Tabl 75 mg	NEIN	NEIN	Z / L			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	BRILIQUE Filmtabl, EFIENT Tabl
PODOMEXEF Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter	PODOMEXEF Susp 40 mg/5 ml
PODOMEXEF Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter	PODOMEXEF Susp 40 mg/5 ml
PONSTAN Filmtabs 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	PONSTAN Susp 10mg/ml, Supp
PONSTAN Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	PONSTAN Susp 10mg/ml, Supp

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
PRADAXA Kaps 110 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Durch das Öffnen der Kapsel kommt es zu 75% höherer Bioverfügbarkeit. WS zudem stark lichtempfindlich und Schleimhautreizend. Nach der Gabe sich nicht mehr hinlegen.	MARCOUMAR Tabl, Niedermolekulare Heparine
PRADAXA Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Durch das Öffnen der Kapsel kommt es zu 75% höherer Bioverfügbarkeit. WS zudem stark lichtempfindlich und Schleimhautreizend. Nach der Gabe sich nicht mehr hinlegen.	MARCOUMAR Tabl, Niedermolekulare Heparine
PRADIF T Ret Tabl 400 mcg	NEIN	NEIN	Keine			X	TAMSULOSIN Ret Kaps öffnen und Inhalt nicht weiter zerkleinern	XATRAL Tabl, TAMSULOSIN Ret Kaps
PRAZINE Drag 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Andere Neuroleptika wie NOZINAN Tr
PRAZINE Drag 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	Andere Neuroleptika wie NOZINAN Tr
PREDNISON Galepharm Tabl 20 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. SOLUPRED Trinklös 1:1 mit Wasser verdünnen.	Parenterales Kortikosteroid, SOLUPRED Trinklös (1 mg/ml Prednisolon)
PREDNISON Galepharm Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. SOLUPRED Trinklös 1:1 mit Wasser verdünnen.	Parenterales Kortikosteroid, SOLUPRED Trinklös (1 mg/ml Prednisolon)
PREDNISON Galepharm Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. SOLUPRED Trinklös 1:1 mit Wasser verdünnen.	Parenterales Kortikosteroid, SOLUPRED Trinklös (1 mg/ml Prednisolon)
PREZISTA Filmtabl 400 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		-	PREZISTA Susp 100 mg/ml
PREZISTA Filmtabl 600 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		-	PREZISTA Susp 100 mg/ml
PREZISTA Filmtabl 800 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		-	PREZISTA Susp 100 mg/ml
PRIADEL Tabl 400 mg Retard	JA	JA	Keine			X	Kontrolle des Lithiumspiegels	QUILONORM Oblong Tabl (nicht Lager)
PRIMAQUIN Tabl 15 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb von 10 Minuten verabreichen	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
PRIMOLUT N Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	-	-
PROGRAF Kaps 0.5 mg	NEIN	NEIN	Kapseln öffnen / S			X (Einnahme immer gleich)	Die verwendete Sonde muss PVC-frei sein. Der Kapselinhalt in 10 ml Wasser suspendierten, innerhalb 10 Minuten verabreichen, gut spülen. Talspiegel messen.	Andere Immunsuppressiva haben auch Trinklös, Patientenspez. Anpassung mit Arzt absprechen
PROGRAF Kaps 1 mg	NEIN	NEIN	Kapseln öffnen / S			X (Einnahme immer gleich)	Die verwendete Sonde muss PVC-frei sein. Der Kapselinhalt in 10 ml Wasser suspendierten, innerhalb 10 Minuten verabreichen, gut spülen. Talspiegel messen.	Andere Immunsuppressiva haben auch Trinklös, Patientenspez. Anpassung mit Arzt absprechen
PROGRAF Kaps 5 mg	NEIN	NEIN	Kapseln öffnen / S			X (Einnahme immer gleich)	Die verwendete Sonde muss PVC-frei sein. Der Kapselinhalt in 10 ml Wasser suspendierten, innerhalb 10 Minuten verabreichen, gut spülen. Talspiegel messen.	Andere Immunsuppressiva haben auch Trinklös, Patientenspez. Anpassung mit Arzt absprechen
PROGYNOVA Drag 2 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Schutzmassnahme einhalten wie Handschuhe. Keine Zubereitung durch Schwangere.	-
PROGYNOVA MITE Drag 1 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Schutzmassnahme einhalten wie Handschuhe. Keine Zubereitung durch Schwangere.	-
PRONTOLAX Drag 5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Dragées mit Magensaft resistentem Überzug, nur duodenale / jejunale Sonden: Z / S	PRONTOLAX Supp / VALVERDE VERSTOPFUNG Sirup / DUPHALAC Sirup / PARAGOL N Emulsion
PROPYCIL Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
PROSCAR Tabl 5 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Der Wirkstoff ist für Frauen im gebärfähigen Alter sehr schädlich! Keine Zubereitung durch Schwangere.	-
PURI-NETHOL Tabl 50 mg	JA	NEIN	(Z / S)	X			Cave: Zytostatikum. Die Tabl dürfen nur im Notfall unter Sonderbedingungen zermörsert werden. WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	XALUPPRINE Susp 20 mg/ml (nicht Lager)
PYRAZINAMID Labatec Tbl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S				WS bitter! Schutzmassnahmen einhalten wie Handschuhe, Mundschutz. Dies trifft insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter zu. Keine Zubereitung durch Schwangere	-
PYRIDOXAL 5 Phosphat Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	-
QUETIAPIN Kaps 5mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS bitter	HALDOL Tr/Temesta Expidet Tabl
QUETIAPIN Sandoz Filmtabl 100 mg	JA	JA (Viertelbar)	Z / S			X	WS bitter, gut suspendieren und innerhalb von 10 min verabreichen	QUETIAPIN Kaps
QUETIAPIN Sandoz Filmtabl 200 mg	JA	JA (Viertelbar)	Z / S			X	WS bitter, gut suspendieren und innerhalb von 10 min verabreichen	QUETIAPIN Kaps
QUETIAPIN Sandoz Filmtabl 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter, gut suspendieren und innerhalb von 10 min verabreichen	QUETIAPIN Kaps
QUETIAPIN Sandoz XR Ret Tabl 200 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	QUETIAPIN Filmtabl
QUETIAPIN Sandoz XR Ret Tabl 300 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	QUETIAPIN Filmtabl
QUETIAPIN Sandoz XR Ret Tabl 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	QUETIAPIN Filmtabl
QUILONORM RETARD Tabl	JA	JA	Keine			X	Retardprinzip geht verloren, engmaschige Kontrolle des Lithiumspiegels sinnvoll	QUILONORM Oblong Tabl (nicht Lager)
RADIOGARDASE CS Kaps 500 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S				WS unlöslich in Wasser, kann Zähne / Sonde blau färben	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
RANITIDIN Mepha Lactab 150 mg	JA	JA	Z / S			X	WS sehr bitter und lichtempfindlich:	ZANTIC Amp iv.
RANITIDIN Mepha Lactab 300 mg	JA	JA	Z / S			X	WS sehr bitter und lichtempfindlich: innerhalb 10 Minuten verabreichen.	ZANTIC Amp iv.
RAPAMUNE Tabl 1 mg	NEIN	NEIN	Keine			X (Einnahme immer gleich)	Direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum)	RAPAMUNE Lös
RASILEZ Filmtabl 150 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
RASILEZ Filmtabl 300 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
REBETOL Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)		X		Schutzmassnahmen einhalten wie Handschuhe, Mundschutz. Dies trifft insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter zu. Keine Zubereitung durch Schwangere. WS bitter, mit Orangensaft suspendieren.	-
REDORMIN Filmtabl 250 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tablette sehr hart und schwer zum zermörsern. Mit Vorteil Alternative verwenden.	SIDROGA Schlaf & Nerventee, DORMEASAN Tr
REMERON Tabl 30 mg	JA	JA	Z / S			X	-	REMERON Schmelztabl
REMERON Tabl 45 mg	JA	JA	Z / S			X	-	REMERON Schmelztabl
REMINYL Prolonged Release Kaps 16 mg	NEIN	NEIN	(Kapseln öffnen / S)			X	Auf genügende Flüssigkeitsaufnahme achten, Pellets nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	EXELON Patch
REMINYL Prolonged Release Kaps 24 mg	NEIN	NEIN	(Kapseln öffnen / S)			X	Auf genügende Flüssigkeitsaufnahme achten, Pellets nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	EXELON Patch
REMINYL Prolonged Release Kaps 8 mg	NEIN	NEIN	(Kapseln öffnen / S)			X	Auf genügende Flüssigkeitsaufnahme achten, Pellets nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	EXELON Patch
RENAGEL Filmtabl	NEIN	NEIN	(Z / S)		X		Magensaftresistenter Überzug geht	CALCIUM ACETAT Filmtabl,

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
RENITEN MITE Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
RENITEN SUBMITE Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
RENITEN Tabl 20 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
REQUIP Filmtabl 0.25mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
REQUIP Filmtabl 1 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
REQUIP Filmtabl 2 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
REQUIP Filmtabl 5 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
REQUIP MODUTAB 2 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Keine			X	Alternative verwenden	REQUIP Filmtabl
REQUIP MODUTAB 4 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Keine			X	Alternative verwenden	REQUIP Filmtabl
REQUIP MODUTAB 8 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Keine			X	Alternative verwenden	REQUIP Filmtabl
RESOLOR Filmtabl 2 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS wirkt auch auf den Magen prokinetisch, Veränderung der Pharmakokinetik möglich.	-
RETROVIR AZT Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	WS lichtempfindlich, klumpt leicht. Alternative verwenden. Wirkstoff extrem bitter!	RETROVIR AZT Sirup 10 mg/ml
REVATIO Filmtabl 20 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Herstellung einer Suspension möglich durch SPH	REVATIO Inj Lös (nicht Lager) SILDENAFIL Susp 2.5 mg/ml
REYATAZ Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Keine		X		Nicht empfehlenswert, da Kapseln aufgeschnitten werden müssten	-
REYATAZ Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	Keine		X		Nicht empfehlenswert, da Kapseln aufgeschnitten werden müssten	-
REYATAZ Kaps 300 mg	NEIN	NEIN	Keine		X		Nicht empfehlenswert, da Kapseln aufgeschnitten werden müssten	-
RIAMET Tabl	JA	NEIN	Z / S		X (fetthaltig)		Essen / fettreiche Nahrung erhöht BV, bitterer Geschmack.	RIAMET Dispersible Tabl (nicht Lager)
RIFAMPICIN Labatec 450 mg Filmtabl	JA	JA	(Z / S)	X			Stark rot gefärbter WS, Hautkontakt meiden. Mir Vorteil Alternative verwenden aufgrund mutagenem Potential	RIFADIN Sirup 100 mg/5 ml

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
RIFAMPICIN Labatec Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Stark rot gefärbter WS, Hautkontakt meiden. Mir Vorteil Alternative verwenden aufgrund mutagenem Potential	RIFADIN Sirup 100 mg/5 ml
RIFATER Drag 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			Stark rot gefärbter WS, Hautkontakt meiden. Mir Vorteil Alternative verwenden aufgrund mutagenem Potential.	-
RIFINAH 150 Drag 150 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			Stark rot gefärbter WS, Hautkontakt meiden. Mir Vorteil Alternative verwenden aufgrund mutagenem Potential.	ISONIAZID Tabl + RIFADIN Sirup 100 mg/5 ml
RILUTEK Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S	X			-	-
RIMACTAN 600 Drag 600 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Stark rot gefärbter WS, Hautkontakt meiden. Mir Vorteil Alternative verwenden aufgrund mutagenem Potential.	RIFADIN Sirup 100 mg/5 ml
RIMSTAR Filmtabl	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Cave: direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden aufgrund mutagenem Potential. WS lichtempfindlich. Nüchtern applizieren, somit auch nicht mit Sondennahrung.	RIFADIN Sirup 100 mg/5 ml mit ISOCID Tabl, MYAMBUTOL Tabl plus PYRAFAT Tabl
RISPERDAL Filmtabl 0.5 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, zermörserte Tabl kann Sonde verkleben. Lösung muss nicht weiter verdünnt werden.	RISPERDAL Lös (1 mg/ml), Quicklet (nicht Lager)
RISPERDAL Filmtabl 1 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, zermörserte Tabl kann Sonde verkleben. Lösung muss nicht weiter verdünnt werden.	RISPERDAL Lös (1 mg/ml), Quicklet (nicht Lager)
RISPERDAL Filmtabl 2 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, zermörserte Tabl kann Sonde verkleben. Lösung muss nicht weiter verdünnt werden.	RISPERDAL Lös (1 mg/ml), Quicklet (nicht Lager)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
RISPERDAL Filmtabl 3 mg	JA	NEIN	Z / S			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, zermörserte Tabl kann Sonde verkleben. Lösung muss nicht weiter verdünnt werden.	RISPERDAL Lös (1 mg/ml), Quicklet (nicht Lager)
RITALIN LA Kaps 20 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	-	RITALIN Tabl
RITALIN SR Ret Tabl 20 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	-	RITALIN Tabl
RITALIN Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
RIVOTRIL Tabl 0.5 mg	JA (Viertelbar)	JA	Z / S			X	-	RIVOTRIL Tr 2.5 mg/ml (=25 Tr)
RIVOTRIL Tabl 2 mg	JA (Viertelbar)	JA	Z / S			X	-	RIVOTRIL Tr 2.5 mg/ml (=25 Tr)
ROCALTROL Kaps 0.25mcg	NEIN	NEIN	Keine			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, Kapselinhalt halbfest	-
ROCALTROL Kaps 0.5 mcg	NEIN	NEIN	Keine			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen, Kapselinhalt halbfest	-
ROHYPNOL Filmtabl 1mg	JA	JA	Z / S			X	Tabl mit blauem Farbstoff	-
RYTMONORM 150 Filmtabs 150 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter und kann leicht betäubendes Gefühl auf der Mundschleimhaut hervorrufen, nur über Sonde verabreichen.	-
SABRIL Tabl 500 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	SABRIL Pulver 500 mg (nicht Lager)
SALAZOPYRIN EN Drag. 0.5 g	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Magensaftresistente Beschichtung zur Verbesserung der Verträglichkeit	SALOFALK Supp / Klystier
SALAZOPYRIN Tabl 500 mg	JA	JA	Z / S			X (bevorzugt)	-	SALOFALK Supp / Klystier
SALOFALK 500 Filmtabl 500 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Tablette nur bei duodenal und jejunal-Sonden Z / S: Magensaftresistenz geht verloren, veränderte Freisetzung im	SALOFALK Supp / Klystier

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
SANDIMMUN NEORAL Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Kapselinhalt nicht inhalieren und direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum). Trink Lös kann mit Wasser oder O-Saft verdünnt werden.	SANDIMMUN NEORAL Trink Lös
SANDIMMUN NEORAL Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Kapselinhalt nicht inhalieren und direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum). Trink Lös kann mit Wasser oder O-Saft verdünnt werden.	SANDIMMUN NEORAL Trink Lös
SANDIMMUN NEORAL Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Kapselinhalt nicht inhalieren und direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen (Immunsuppressivum). Trink Lös kann mit Wasser oder O-Saft verdünnt werden.	SANDIMMUN NEORAL Trink Lös
SAROTEN RETARD Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets (Ø <1.2mm) sind nicht wasserlöslich und auch nicht suspendierbar.	SURMONTIL Tr 4% (Trimipramin)
SAROTEN RETARD Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets (Ø <1.2mm) sind nicht wasserlöslich und auch nicht suspendierbar.	SURMONTIL Tr 4% (Trimipramin)
SELIPRAN 20 Tabl 20 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
SELIPRAN 40 Tabl 40 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
SERESTA Tabl 15 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	TEMESTA Expidet Tabl
SERESTA Tabl 50 mg forte	JA	NEIN	Z / S			X	-	TEMESTA Expidet Tabl
SEROPRAM Filmtabl 20 mg	JA	JA	Z / S			X	-	ESCITALOPRAM Sandoz Tr 20 mg/ml (=20 gtt)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
SERTRALIN Pfizer 50 mg	JA	JA	Z / S			X	Das orale Konzentrat muss verdünnt werden	ZOLOFT orales Konz. 20 mg/ml (nicht Lager)
SEVIKAR Filmtabl 40/5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	AMLODIPIN Tabl plus AT2-Antagonist
SEVIKAR HCT 20/5/12.5 mg Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS lichtempfindlich, sofort verabreichen	AMLODIPIN Tabl plus AT2-Antagonist plus ESIDREX Tabl
SEVRE LONG Ret Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets nicht weiter zermörsern, Sonde mit CH≥16 notwendig.	MST continus Susp ret. / MORPHIN Tr 20 mg/ml
SEVRE LONG Ret Kaps 60 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets nicht weiter zermörsern, Sonde mit CH≥16 notwendig.	MST continus Susp ret. / MORPHIN Tr 20 mg/ml
SEVREDOL Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	MORPHIN Tr 20 mg/ml
SIFROL Tabl 0.125 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
SIFROL Tabl 0.25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
SIFROL Tabl 0.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
SIMVASTIN MEPHA 20 Lactabs 20 mg	JA	Ja	Z / S			X	Sonde gut nachspülen. WS lichtempfindlich, Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
SIMVASTIN MEPHA 40 Lactabs 40 mg	JA	JA	Z / S			X	Sonde gut nachspülen. WS lichtempfindlich, Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
SINEMET CR Tabl 50mg/200mg	NEIN	NEIN	S			X	Suspendierbar in Wasser, nicht zermörsern, Zermörsern kann die Oxidationsrate von Levodopa beschleunigen, was eine dunkle Verfärbung von Speichel, Zähne etc. begünstigen kann.	SINEMET Tabl
SINEMET Tabl 25mg/100mg	JA	NEIN	Z / S			X	Innert 10 min verabreichen. Zermörsern kann die Oxidationsrate von Levodopa beschleunigen, was eine dunkle Verfärbung von Speichel, Zähne etc. begünstigen kann.	-
SINGULAIR Filmtabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	SINGULAIR Gran 4 mg, Kautabl 5 mg (nicht Lager)
SINQUAN 25 Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
SINQUAN 50 Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	-	-
SINTROM 1 MITIS Tabl 1 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS unlöslich in Wasser, Resorption verändert: Quick-Kontrolle notwendig	Heparine sc. / iv.
SINTROM 4 Tabl 4 mg	JA (viertelbar)	JA	Z / S			X	WS unlöslich in Wasser, Resorption verändert: Quick-Kontrolle notwendig	Heparine sc. / iv.
SINUPRET Drag	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
SIRDALUD MR Ret Kaps 6 mg	NEIN	NEIN	(Kapsel öffnen / S)			X	Pellets nicht weiter zermörsern (MR = Modified release, Ø < 1mm) Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	SIRDALUD Tabl
SIRDALUD Tabl 2 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
SIRDALUD Tabl 4 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
SOLIAN 100 Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	-	SOLIAN Tropfen 100 mg/ml (nicht Lager)
SOLIAN 200 Tabl 200 mg	JA	JA	Z / S			X	-	SOLIAN Tropfen 100 mg/ml (nicht Lager)
SOLIAN 400 Tabl 400 mg	JA	JA	Z / S			X	-	SOLIAN Tropfen 100 mg/ml (nicht Lager)
SOTALOL Mepha Tabl 160 mg	JA (Viertelbar)	JA	Z / S			X	-	-
SPASMO CANULASE Bitabs	NEIN	NEIN	(Z / S)		X		Tablette nur bei duodenal und jejunal- Sonden Z / S: Magensaftresistenz geht verloren	FLATULEX Tr
SPASMO URGENIN NEO Drag	NEIN	NEIN	Z / S	X			-	KENTERA TTS
SPORANOX Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S		X		Pellets passen durch Sonde CH≥15	SPORANOX Oral Solution 10 mg/ml
STALEVO 100/25/200 Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Kann auch in Joghurt gemischt werden. Tabl enthalten gelben Farbstoff, der die Sonde etc. verfärben kann	MADOPAR Liq Tabl + COMTAN Tabl (Dosierung!)
STALEVO 150/37.5/200 Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Kann auch in Joghurt gemischt werden. Tabl enthalten gelben Farbstoff, der die Sonde etc. verfärben kann	MADOPAR Liq Tabl + COMTAN Tabl (Dosierung!)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
STALEVO 50/12.5/200 Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Kann auch in Joghurt gemischt werden. Tabl enthalten gelben Farbstoff, der die Sonde etc. verfärben kann	MADOPAR Liq Tabl + COMTAN Tabl (Dosierung!)
STILNOX Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	WS sehr bitter, WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	-
STOCRIN Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)	X			Wirkstoff in Wasser unlöslich, Verstopfungsgefahr gross, auch bei den Tabl. Die BV der Lös ist um 20% vermindert: 720 mg der Lös entspricht 1 Filmtabl. 600 mg.	STOCRIN Lös 30 mg/ml (nicht Lager)
STRIBILD Filmtabl 150/150/200/245 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
STROMEKTOL Tabl 3 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			-	INFECTOS CAB Creme
STUGERON Tabl 25 mg	JA	JA	(Z / S)			X	WS kann Sonde verkleben	STUGERON Tr 75 mg/ml (nicht Lager)
SUBUTEX Subling Tabl 0.4 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Tabl muss unter Zunge vollständig zerfallen (5-10 min), Tabl nicht schlucken (hoher first pass effect)	-
SUBUTEX Subling Tabl 2 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Tabl muss unter Zunge vollständig zerfallen (5-10 min), Tabl nicht schlucken (hoher first pass effect)	-
SUBUTEX Subling Tabl 8 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Tabl muss unter Zunge vollständig zerfallen (5-10 min), Tabl nicht schlucken (hoher first pass effect)	-
SUCCICAPTAL 200 mg Kaps	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Mit Fruchtsaft einnehmen, unangenehmer Schwefelgeruch	-
SULFADIAZIN Heyl Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Schnell zerfallende Tablette	-
SUPRADYN energy Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Schlecht suspendierbar, Brausetabl in mind. 20 ml Wasser lösen und innerhalb 10 Minuten verabreichen	SUPRADYN Brausetabl, JEMALT (Proviandienst)
SURMONTIL 100 mg Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	-	SURMONTIL Tr 40 mg/ml
SURMONTIL 100 Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	-	SURMONTIL Tr 40 mg/ml
SURMONTIL 25 mg Tabl 25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	SURMONTIL Tr 40 mg/ml
SYMFONA Forte Kaps	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS bitter, klebt zusammen	GERIAFORCE Tr 920 mg/ml (nicht Lager)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
SYMFONA Kaps	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS bitter, klebt zusammen	GERIAFORCE Tr 920 mg/ml (nicht Lager)
TALOXIA Tabl 600 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	TALOXIA Susp 600 mg/5 ml (nicht Lager)
TAMBOCOR Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TAMBOCOR Amp (nur parenterale Gabe)
TAMIFLU Kaps 30 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS bitter, in gesüsste Lösung/Nahrungsmittel geben und innerhalb 10 Minuten verabreichen	TAMIFLU Susp 6 mg/ml
TAMIFLU Kaps 45 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS bitter, in gesüsste Lösung/Nahrungsmittel geben und innerhalb 10 Minuten verabreichen	TAMIFLU Susp 6 mg/ml
TARDYFERON 30 Depotdrag	NEIN	NEIN	Keine	(X)			-	MALTOFER Tr 50 mg/ml, parenterales Eisen
TARGIN Ret Tabl 10/5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren (Matrixtabl). Beim Ersatz mit Oxynorm Tropfen ist auf eine Laxantiengabe zu achten.	OXYNORM Tr (unretardiert, ohne Naloxon), anderes Opiat
TARGIN Ret Tabl 20/10 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren (Matrixtabl). Beim Ersatz mit Oxynorm Tropfen ist auf eine Laxantiengabe zu achten.	OXYNORM Tr (unretardiert, ohne Naloxon), anderes Opiat
TARGIN Ret Tabl 5/2.5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren (Matrixtabl). Beim Ersatz mit Oxynorm Tropfen ist auf eine Laxantiengabe zu achten.	OXYNORM Tr (unretardiert, ohne Naloxon), anderes Opiat
TAVANIC Tabl 250 mg	JA	JA	Z / S			X	-	TAVANIC Amp iv. (nur parenterale Gabe)
TAVANIC Tabl 500 mg	JA	JA	Z / S			X	-	TAVANIC Amp iv. (nur parenterale Gabe)
TAVEGYL Tabl 1 mg	JA	JA	Z / S			X	WS lichtempfindlich: Innerhalb von 10 Minuten verabreichen	XYZAL Tr 5 mg/ml, TAVEGYL Amp (nur parenterale Gabe)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
TEGRETOL 200 Tabl 200 mg	JA	JA	Z / S			X	Der Sirup soll vor der Gabe per Sonde 1:1 mit NaCl 0.9% oder Gluc. 5% verdünnt werden (vermindert Wirkstoffverlust), Spiegelkontrolle sinnvoll	TIMONIL Sirup 100 mg/5 ml
TEGRETOL CR 200 Divitabs 200 mg	JA	JA	Keine			X	Der Sirup soll vor der Gabe per Sonde 1:1 mit NaCl 0.9% oder Gluc. 5% verdünnt werden (vermindert Wirkstoffverlust), Spiegelkontrolle sinnvoll	TIMONIL Sirup 100 mg/5 ml
TEGRETOL CR 400 Divitabs 200 mg	JA	JA	Keine			X	Der Sirup soll vor der Gabe per Sonde 1:1 mit NaCl 0.9% oder Gluc. 5% verdünnt werden (vermindert Wirkstoffverlust), Spiegelkontrolle sinnvoll	TIMONIL Sirup 100 mg/5 ml
TELFAST Tabl 120 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	XYZAL Tr 5 mg/ml, TAVEGYL Amp (nur parenterale Gabe)
TELFAST Tabl 180 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	XYZAL Tr 5 mg/ml, TAVEGYL Amp (nur parenterale Gabe)
TELZIR Filmtabletten 700 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Alternative verwenden, es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor. WS ist bitter.	TELZIR Susp (nicht Lager)
TEMESTA Tabl 1 mg	JA	JA	Z / S			X	Tabl in 15 ml Wasser lösen, Expidet Tabl. können auch in 5ml Wasser gelöst werden	TEMESTA EXPIDET Tabl, LORAZEPAM Amp 4 mg/ml
TEMESTA Tabl 2.5 mg	JA	JA	Z / S			X	Tabl in 15 ml Wasser lösen, Expidet Tabl. können auch in 5ml Wasser gelöst werden	TEMESTA EXPIDET Tabl, LORAZEPAM Amp 4 mg/ml
TEMGESIC SUBLINGUAL Tabl 0.2 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Tabl muss unter Zunge vollständig zerfallen (5-10 min), Tabl nicht schlucken	TRANSTEC TTS, TEMGESIC Amp (nur parenterale Gabe)
TENORETIC MITE Tabl 50/12.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
TENORETIC Tabl 100/25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
TENORMIN 100 mg Tabl	JA	JA	Z / S			X	-	-
TENORMIN MITE Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
THALIDOMID KAPS 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	WS Teratogen. Schutzmassnahmen einhalten wie Handschuhe, Mundschutz. Dies trifft insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter zu.	-
THYBON 20 Henning Tabl	JA	JA	(Z / S)	X			-	-
TIAPRIDAL Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
TILUR RETARD Kaps 90 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Granulat darf nicht weiter zerkleinert werden	INDOCID Supp (nicht Lager) /andere NSAR (VOLTAREN Dispersible, PONSTAN Susp)
TIMONIL 200 RETARD Tabl 200 mg	JA	JA	S			X	Retardeffekt bleibt erhalten (Retardgranula Ø < 1.2 mm), suspendierbar in 20 ml Wasser	TIMONIL Sirup 20 mg/ml
TIMONIL 200 Tabl 200 mg	JA	JA	S			X	Suspendierbar in 20 ml Wasser	TIMONIL Sirup 20 mg/ml
TIMONIL 300 RETARD Tabl 300 mg	JA	JA	S			X	Retardeffekt bleibt erhalten (Retardgranula Ø < 1.2 mm), suspendierbar in 20 ml Wasser	TIMONIL Sirup 20 mg/ml
TIMONIL 400 RETARD Tabl 400 mg	JA	JA	S			X	Retardeffekt bleibt erhalten (Retardgranula Ø < 1.2 mm), suspendierbar in 20 ml Wasser	TIMONIL Sirup 20 mg/ml
TIMONIL 600 RETARD Tabl 600 mg	JA	JA	S			X	Retardeffekt bleibt erhalten (Retardgranula Ø < 1.2 mm), suspendierbar in 20 ml Wasser	TIMONIL Sirup 20 mg/ml
TIVICAY Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Sofort verabreichen	-
TOLVON Tabl 30 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	-
TOLVON Tabl 60 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	-
TOPAMAX Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS stark bitter, zermörsern und in ca 100ml Wasser suspendieren (3 Min. rühren). Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TOPAMAX Kaps (nicht Lager)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
TOPAMAX Tabl 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS stark bitter, zermörsern und in ca 100ml Wasser suspendieren (3 Min. rühren). Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TOPAMAX Kaps (nicht Lager)
TOPAMAX Tabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS stark bitter, zermörsern und in ca 100ml Wasser suspendieren (3 Min. rühren). Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TOPAMAX Kaps (nicht Lager)
TORA DOL Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Ampullen enthalten 10 mg/ml Alkohol	TORA DOL Amp (Gabe auch oral per Sonde möglich)
TOREM 10 Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	LASIX Amp (nur parenterale Gabe)
TOREM 200 Tabl 200 mg	JA	JA	Z / S			X	-	LASIX Amp (nur parenterale Gabe)
TOREM 5 Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	LASIX Amp (nur parenterale Gabe)
TOVIAZ Ret Tabl 4 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren	DETRUSITOL Ret Kaps
TOVIAZ Ret Tabl 8 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren	DETRUSITOL Ret Kaps
TRACLEER 125 Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tabl löst sich in 20ml warmen Wasser auf (max 37 Grad). Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen.	-
TRACLEER 62.5 Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Tabl löst sich in 20ml warmen Wasser auf (max 37 Grad). Innerhalb 10 Minuten verabreichen. Direkten Kontakt mit Haut / Schleimhaut vermeiden, nicht durch Schwangere zubereiten lassen.	-
TRAJENTA Filmtabl 5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
TRAMAL Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen			X	-	TRAMAL Tr / Supp
TRAMAL RETARD Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	TRAMAL Tr / Supp
TRAMAL RETARD Tabl 150 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	TRAMAL Tr / Supp
TRAMAL RETARD Tabl 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	TRAMAL Tr / Supp

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
TRANDATE Tabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Ampullen können oral verabreicht	TRANDATE Amp 5 mg/ml
TRANDATE Tabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Ampullen können oral verabreicht	TRANDATE Amp 5 mg/ml
TRAUMANASE FORTE Drag	NEIN	NEIN	Keine			X	Magensaftresistente Beschichtung	-
TRIALIX Tabl	JA	JA	Z / S			X	-	-
TRIA TEC 1.25 Tabl 1.25 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	-
TRIA TEC 10 Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
TRIA TEC 2.5 Tabl 2.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
TRIA TEC 5 Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
TRIA TEC COMP MITE Tabl 2.5/12.5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
TRIA TEC COMP Tabl 5/25 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
TRILEPTAL Filmtabl 300 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	TRILEPTAL Susp 60 mg/ml (nicht Lager)
TRILEPTAL Filmtabl 600 mg	JA	JA	Z / S			X	Mit Vorteil Alternativen benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	TRILEPTAL Susp 60 mg/ml (nicht Lager)
TRITTICO Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S			X	Säuerlich- bitterer Geschmack	-
TRITTICO Tabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	Säuerlich- bitterer Geschmack	-
TRIUMEQ Filmtabl 50 mg/600 mg /300 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Nicht zusammen mit zweiwertigen Kationen wie Magnesium oder Calcium verabreichen. PPI und Sondenkost ebenfalls 2 h nach oder 6 h vor Gabe verabreichen.	-
TRIZIVIR Tabl	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich	RETROVIR Sirup + 3TC Lös + ZIAGEN Lös
TROBALT Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich	-
TROBALT Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich	-
TROBALT Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Es liegen keine Angaben zur Sondengabe vor, theoretisch aber mit klinischer Überprüfung möglich	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
TRUVADA Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S		X		In mind. 100 ml Wasser, Orangensaft oder Traubensaft suspendieren und nach	EMTRIVA Lös + VIREAD Filmtabl
TRUXAL Filmtabl 15 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
TRUXAL Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	-
UBRETID Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S	X			-	PROSTIGMIN Amp
UNIFYL CONTINUS Ret Tabl 200 mg	JA	JA	Keine			X (Einnahme immer gleich)	Retardprinzip geht verloren, Amp dürfen auch oral gegeben werden	EUPHYLLIN N Amp
UNIFYL CONTINUS Ret Tabl 400 mg	JA	JA	Keine			X (Einnahme immer gleich)	Retardprinzip geht verloren, Amp dürfen auch oral gegeben werden	EUPHYLLIN N Amp
UNIFYL CONTINUS Ret Tabl 600 mg	JA	JA	Keine			X (Einnahme immer gleich)	Retardprinzip geht verloren, Amp dürfen auch oral gegeben werden	EUPHYLLIN N Amp
URBANYL Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
URISPAS Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	(Z / S)			X	Gefahr von UAW im Gastrointestinaltrakt erhöht, zermörsern geht schlecht, harte Filmtablette	DETRUSITOL SR Kaps (nicht Lager), KENTERA TTS
UROMITEXAN Filmtabl 400 mg	JA	JA	Z / S			X	Die Amp dürfen auch oral gegeben werden, mit mind. 30ml Wasser verdünnen	UROMITEXAN Amp
URSOFALK Kaps	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	WS licht- und feuchtigkeitsempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. WS nicht wasserlöslich, unangenehmer Geschmack	URSOFALK Susp (nicht Lager)
UTROGESTAN 200 Kaps 200 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Kaps lassen sich nicht öffnen, enth. Mikrokrystalliner, nicht wasserlöslicher WS, für bestimmte Indikationen vaginale Anwendung	-
UVAMIN RETARD Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt durch kristalliner Struktur des WS. Die Nahrungsaufnahme steigert die Bioverfügbarkeit.	-

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
VALCYTE Filmtabl 450 mg	NEIN	NEIN	Keine		X		Schutzmassnahmen einhalten wie Handschuhe, Mundschutz. Dies trifft insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter zu. Keine Zubereitung durch Schwangere. Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	VALCYTE Pulver zur Herstellung einer oralen Lösung 50 mg/ml (NZA, nicht Lager)
VALDOXAN Filmtabl 25 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Innerhalb von 10 min verabreichen	-
VALIUM Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	Sehr fein mörsern	DIAZEPAM Rectal Tube, PSYCHOPAX Tr 12.5 mg/ml
VALIUM Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	Sehr fein mörsern	DIAZEPAM Rectal Tube, PSYCHOPAX Tr 12.5 mg/ml
VALIUM Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	Sehr fein mörsern	DIAZEPAM Rectal Tube, PSYCHOPAX Tr 12.5 mg/ml
VALIUM Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	Sehr fein mörsern	DIAZEPAM Rectal Tube, PSYCHOPAX Tr 12.5 mg/ml
VALTREX Filmtabl 250 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl sehr hart und schwer zum zermörsern. WS sehr bitter	ACICLOVIR Amp 250 mg
VALTREX Filmtabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl sehr hart und schwer zum zermörsern. WS sehr bitter	ACICLOVIR Amp 250 mg
VALVERDE Entspannung Filmtabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	Filmtabl sehr hart und schwer zum zermörsern	SIDROGA SCHLAF & NERVENTEE
VENLAFAXIN ER 150 Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets (CH ₂ ≥14 notwendig) nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren.	VENLAFAXIN Tabl
VENLAFAXIN ER 150 Kaps 150 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen und suspendieren	G		X	Pellets (CH ₂ ≥14 notwendig) nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren.	VENLAFAXIN Tabl
VENLAFAXIN ER 37.5 mg Kaps 37.5 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets (CH ₂ ≥14 notwendig) nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren.	VENLAFAXIN Tabl

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
VENLAFAXIN ER 75 Kaps 75 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Pellets (CH≥14 notwendig) nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren.	VENLAFAXIN Tabl
VENLAFAXIN Mepha Tabl 37.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Sonde mit CH>8 notwendig	-
VEPESID Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Cave: Zytostatikum. Die Kapseln dürfen nur unter Spezialbedingungen geöffnet werden	ETOPOPHOS Amp (nur parenterale Gabe)
VERMOX Tabl 100 mg	JA	JA	Z / S		X		Tabl können auch zerkaut werden. Wenn möglich mit fettreicher Nahrung einnehmen	-
VESANOID Kaps 10 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Cave: Zytostatikum! Schutzmassnahmen einhalten wie Handschuhe, Mundschutz. Dies trifft insbesondere für Frauen im gebärfähigen Alter zu. Keine Zubereitung durch Schwangere	-
VIBRAMYCIN TABS Tabl 100 mg	JA	NEIN	S	X			In 50 ml Wasser suspendieren, Mindestens 1h vor oder 1h nach Sondennahrung verabreichen.	VIBRAVENÖS Amp (nur parenterale Gabe)
VIDEX EC Kaps 250 mg	NEIN	NEIN	Keine	X			Mindestens 2h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. Pellets nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren, nur in Wasser suspendieren; geht schlecht.	VIDEX Trockensaft (NZA, nicht Lager)
VIDEX EC Kaps 400 mg	NEIN	NEIN	Keine	X			Mindestens 2h Pause vor/nach Essen/Sondenkost. Pellets nicht weiter zermörsern, Retardprinzip geht verloren,	VIDEX Trockensaft (NZA, nicht Lager)
VIMPAT Filmtabl 100 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Grössere individuelle Schwankungen in der Resorptionsgeschwindigkeit möglich	VIMPAT Amp / Sirup 10 mg/ml
VIMPAT Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Grössere individuelle Schwankungen in der Resorptionsgeschwindigkeit möglich	VIMPAT Amp / Sirup 10 mg/ml

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
VIMPAT Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Grössere individuelle Schwankungen in der Resorptionsgeschwindigkeit möglich	VIMPAT Amp / Sirup 10 mg/ml
VIRAMUNE Ret Tabl 400 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Suspension bevorzugen	VIRAMUNE Susp 50 mg/5 ml (NZA)
VIRAMUNE Tabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Suspension bevorzugen, Tablette in Wasser suspendierbar	VIRAMUNE Susp 50 mg/5 ml (NZA)
VIREAD Filmtabl 245 mg	NEIN	NEIN	S		X		In mind. 100 ml Wasser, Orangensaft oder Traubensaft suspendieren und nach der Gabe Sonde gut spülen.	-
VITAMIN B6 Streuli Tabl 40 mg	JA	JA	Z / S		X		Nicht für jejunale Sondengabe	VITAMIN B6 Amp
VITAMIN E 300 mg Kaps 300 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Inhalt der Kaps flüssig	-
VIVOTIF Kaps 3 Stk	NEIN	NEIN	Keine				Kapsel mit Magensaftresistentem Überzug	-
VOLTAREN 25 Drag 25 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Nicht für jejunale Sondengabe	VOLTAREN Supp, Amp, VOLTFAST Gran
VOLTAREN 50 Drag 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Nicht für jejunale Sondengabe	VOLTAREN Supp, Amp, VOLTFAST Gran
VOLTAREN RAPID Drag 50 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Nicht für jejunale Sondengabe	VOLTAREN Supp, Amp, VOLTFAST Gran
VOLTAREN RETARD 100 Drag 100 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Nicht für jejunale Sondengabe	VOLTAREN Supp, Amp, VOLTFAST Gran
VOLTAREN RETARD Drag 75 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Nicht für jejunale Sondengabe	VOLTAREN Supp, Amp, VOLTFAST Gran
VORICONAZOL Pfizer Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			-	-
VORICONAZOL Pfizer Filmtabl 50 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			-	-
WELLBUTRIN XR Ret Tabl 150 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardeffekt geht verloren	-
XANAX RETARD Tabl 0.5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren (Matrixtabl)	XANAX Tabl
XANAX RETARD Tabl 1 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren (Matrixtabl)	XANAX Tabl

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
XANAX RETARD Tabl 3 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren (Matrixtabl)	XANAX Tabl
XANAX Tabl 0.25 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	-
XANAX Tabl 0.5 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	-
XANAX Tabl 1 mg	JA	NEIN	Z / S			X	-	-
XARELTO Filmtabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS ist praktisch unlöslich in Wasser, Sonde gut spülen. Nur für Magensonde geeignet.	Niedermolekulare Heparine therapeutisch sc./iv.
XARELTO Filmtabl 15 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		WS ist praktisch unlöslich in Wasser, Sonde gut spülen. Nur für Magensonde geeignet.	Niedermolekulare Heparine therapeutisch sc./iv.
XARELTO Filmtabl 20 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		WS ist praktisch unlöslich in Wasser, Sonde gut spülen. Nur für Magensonde geeignet.	Niedermolekulare Heparine therapeutisch sc./iv.
XATRAL Filmtabl 2.5 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS bitter und lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen	TAMSULOSIN Ret Kaps
XATRAL UNO Ret Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Retardprinzip geht verloren	XATRAL Tabl, TAMSULOSIN Ret Kaps
XELODA Filmtabl 150 mg	NEIN	NEIN	Keine		X		Cave: Zytostatikum. Die Tabletten können mit spez. Vorsichtsmassnahmen in Wasser suspendiert werden (innerhalb ca. 15 Minuten) und per Sonde verabreicht werden. Zubereitung erfolgt über Herstellung SPh	-
XELODA Tabl 500 mg	NEIN	NEIN	Keine		X		Cave: Zytostatikum. Die Tabletten können mit spez. Vorsichtsmassnahmen in Wasser suspendiert werden (innerhalb ca. 15 Minuten) und per Sonde verabreicht werden. Zubereitung erfolgt über Herstellung SPh	-
XYZAL Filmtabl 5 mg teilbar	JA	JA	(Z / S)			X	Mit Vorteil Alternative benutzen, Filmtabl schwer suspendierbar, Verstopfung der Sonde möglich	XYZAL Tr (5mg/ml)
ZALDIAR Tabl	NEIN	NEIN	Z / S			X	WS sehr bitter	TRAMAL Tr + DAFALGAN BrTabl / ZALDIAR Brausetabl

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
ZANIDIP Tabl 10 mg	JA	JA	Z / S			X	-	AMLODIPIN Tabl
ZANTIC Tabl 150 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Resorption verändert,WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. WS sehr bitter.	ZANTIC Amp (orale Gabe möglich)
ZANTIC Tabl 300 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Resorption verändert,WS lichtempfindlich: Innerhalb 10 Minuten verabreichen. WS sehr bitter.	ZANTIC Amp (orale Gabe möglich)
ZERIT Kaps 40 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S	X			Kapselinhalt aufschwemmen und mit genügend Flüssigkeit verabreichen	-
ZESTORETIC MITE Tabl 10/12.5	JA	NEIN	(Z / S)			X	Tabletten sind stärkehaltig, gut suspendieren und innerhalb von 10 min verabreichen	-
ZESTORETIC Tabl 20/12.5	JA	NEIN	(Z / S)			X	Tabletten sind stärkehaltig, gut suspendieren und innerhalb von 10 min verabreichen	-
ZESTRIL Tabl 10 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
ZESTRIL Tabl 20 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	-	-
ZESTRIL Tabl 5 mg	JA	JA	Z / S			X	-	-
ZIAGEN Tabl 300 mg	JA	JA	Z / S			X	WS bitter, sofort verabreichen	ZIAGEN Lös. (nicht Lager)
ZINAT Filmtabl 250 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		WS sehr bitter, geschmacklicher Überzug	ZINAT Susp 125 mg/5 ml
ZINAT Filmtabl 500 mg	NEIN	NEIN	Z / S		X		WS sehr bitter, geschmacklicher Überzug	ZINAT Susp 125 mg/5 ml
ZINK Biomed Filmtabl 20 mg	NEIN	NEIN	Z / S	X			-	BEROCCA CA MG ZN BrTabl.(mit 10 mg Zink), UNIZINK Amp 30 mg/10 ml
ZOFRAN ZYDIS Lingual Tabl 4 mg	NEIN	NEIN	S			X	Tabl zerfällt mit wenig Wasser	ZOFRAN Sirup (nicht Lager)
ZOLOFT Filmtabl 50 mg	JA	JA	Z / S			X	Das orale Konzentrat muss verdünnt werden	ZOLOFT orales Konz. 20 mg/ml (enthält Alkohol, ist nicht Lager)
ZOMIG Filmtabl 2.5 mg	NEIN	NEIN	Keine			X	Zomig oro Tabl können in wenig Wasser gelöst werden	ZOMIG oro (2.5mg)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar

Zermörserbarkeit von Tabletten

Präparat	Bruchrille	Dosis- halbierung	Art der Zerkleinerung	Zwingend nüchtern	Zwingend mit Nahrung	Unabhängig von Mahlzeit	Kommentar	Alternative
ZONEGRAN Kaps 100 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Kann in Wasser oder Apfelsaft suspendiert werden oder unter Cremes gemischt werden	-
ZONEGRAN Kaps 25 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Kann in Wasser oder Apfelsaft suspendiert werden oder unter Cremes gemischt werden	-
ZONEGRAN Kaps 50 mg	NEIN	NEIN	Kapsel öffnen / S			X	Kann in Wasser oder Apfelsaft suspendiert werden oder unter Cremes gemischt werden	-
ZOVIRAX 200 Filmtabl 200 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Suspendierbar in mind. 50 ml Wasser	ZOVIRAX Susp (400 mg/5 ml)
ZOVIRAX 400 Filmtabl 400 mg	NEIN	NEIN	Z / S			X	Suspendierbar in mind. 50 ml Wasser	ZOVIRAX Susp (400 mg/5 ml)

Z / S: zermörserbar und suspendierbar (): mit Einschränkung zermörserbar und suspendierbar oder Kapsel zu öffnen L: Löslich S: direkt suspendierbar T: Teilbar